

Bonjour,

Voici une nouvelle édition de notre catalogue. Nous cultivons des plantes pour créer des jardins secs et naturels en Méditerranée. Nous affectionnons les espaces au profil impossible, zone aride et rocailleuse, talus, éboulis, restanque écroulée. ... et aussi les plantes sauvages, les plantes locales, les plantes méditerranéennes de différentes régions du globe.

Les plantes sont toujours sélectionnées en fonction de différents critères, notamment celui de la résistance à la sécheresse mais aussi au froid, au vent, aux fortes amplitudes thermiques et à leur facilité de culture. Chacune d'elle est testée en place dans notre jardin et nos rocailles. Ainsi nous pouvons vous conseiller sur la capacité de nos plantes à résister au froid et à la sécheresse. Néanmoins, cette résistance est un critère relatif qu'il faut juger avec précaution car les conditions de sol, d'exposition, de climat, d'altitude, peuvent modifier le comportement des plantes.

Nous portons une attention particulière aux insectes qui habitent le jardin et menons un travail d'observation de ces divers pollinisateurs à la fois domestiques et sauvages ainsi qu'un inventaire des espèces de plantes pollinisées par ceux-ci. Nous sélectionnons des plantes autonomes qui se développent sans arrosage autre que celui du ciel lorsque les plantes sont installées dans le jardin.

Pépinière de production, nous les élevons sans artifices, ni pesticides, en serre froide, dans des contenants favorisant le système racinaire. Ces techniques de culture permettent de limiter le stress des végétaux lors de la plantation dans votre jardin.

Dans le dessein de favoriser la diversité et la richesse botanique des espèces végétales en culture, nous avons fait le choix de produire un certain nombre de celle-ci en petite quantité. Il est possible qu'elles soient momentanément épuisées ou en cours de culture, surtout durant le printemps. Certaines plantes ne sont donc pas toujours disponibles.

Nous pouvons les produire sur commande. N'hésitez pas à les réserver lors de votre projet, nous les mettrons en culture.

Nous sommes à votre disposition pour vous orienter dans le choix des plantes, et vous conseiller sur leur mode de culture.

Nous vous souhaitons une bonne saison de jardinage

Isabelle et Benoit



Membre de l'association des pépiniéristes collectionneurs



vue du jardin de la pépinière



Dianthus lusitanicus



Serre de bouturage



jardin de rocaille



Code couleurs
«marque-pages»



SOMMAIRE

Les vivaces 5

Les graminés 56

Les arbustes 62

Conseil de plantation et de culture 92

Tarif & Condition de vente 95-96

Utiliser le catalogue

La fiche pour chaque plante se présente comme l'exemple >>>

icone : nouveauté 

genre - espèce - sous-espèce
hybride - variété - cultivar

famille : famille

syn. *synonyme*

milieu : milieu origine

géo : origine géographique

Le texte présente : la hauteur, les couleurs de floraison, le type de feuillage, l'exposition, la résistance au froid, l'utilisation au jardin, la quantité par m2 dans certain cas.

code tarif **code_tarif page 99**

EARL Pépinière de l'Armalette, chemin de la piscine
83690 Sillans la Cascade
N°SIRET : 79000815500018
RCS Draguignan : 790008155
N°TVA intra : FR 03790008155 - n° Phyto : PA04657



Association de vivaces



Aethionema cretica



Vivaces en bord de restanque



Euphorbia ceratocarpa, *Lavandula stoechas*



Association couvre sol et vivaces

les vivaces

Les vivaces se trouvent dans tous les milieux. Certaines sont des plantes de prairies, d'autre de steppe aride, de bord de chemin ou de sous bois humide... Acclimatées depuis des siècles au grand bonheur des jardiniers elles composent traditionnellement les massifs appelé outre Manche « Mixed-border ». Seules ou associées aux arbustes et aux graminées, la délicatesse de leurs fleurs et l'infinie variétés de leurs couleurs créent l'événement au jardin.

Composer un jardin de vivaces en méditerranée c'est aussi définir des groupements végétaux en fonction de leur besoins et de leur développement.

La gamme de vivaces proposées dans le catalogue répond aux critères contrastés du climat méditerranéen. Elles sont sélectionnées en fonction de leur résistance à la sécheresse mais aussi au froid , au vent, aux fortes amplitudes thermiques et à leur facilité de culture.



Association couvre sol et vivaces



Romneya coulteri var. trichocalyx



Digitalis obscura

A **Acanthus mollis**

famille : **Acanthaceae**

syn. : *A. latifolius*

milieu : friche mésoxérophile, broussaille, bord de chemin de 0 à 300m d'alt

géo : Europe méditerranéenne, Afrique du Nord

Large touffe de feuillage vert brillant, découpée de 50 cm à 80 cm de large. Le feuillage rentre en repos en été après la floraison. Floraison blanche entourée de bractées rose violacé sur de hautes hampes florales de 1,25 m. au printemps, fin de printemps. Ombre, mi-ombre, sol bien drainé. -12°C. 3 /m2 . Massif, couvre sol.

code tarif **D**

Acanthus spinosus

famille : **Acanthaceae**

milieu : colline rocheuse, broussaille, prairie

géo : Grèce, Balkans, Italie

Large touffe de feuillage vert foncé, très découpée et épineuse de 50 cm à 60 cm de large. Le feuillage rentre en repos en été. Floraison blanche entourée de bractées rose violacé au printemps, fin de printemps. Soleil, mi-ombre, sol bien drainé. -15°C. 3 /m

code tarif **E**

Achillea ageratifolia

famille : **Asteraceae**

milieu : rocaille calcaire

géo : Balkans

Coussin compact au feuillage gris argent de 5 cm de hauteur sur 30 cm de large. Floraison blanche en ombelle de 15 cm de hauteur au printemps. Soleil, sol bien drainé. -20°C. Rocaille, massif. 5 /m2

code tarif **D**

Achillea clypeolata

famille : **Asteraceae**

milieu : prairies calcaires et rocailleuses entre 500 et 1900m d'altitude

géo : Grèce

Feuillage gris blanc, duveteux, finement découpé. Bouton floral blanc duveteux s'ouvrant en ombelle jaune vif en juin juillet . 40 à 80 cm de hauteur en fleur. Rosette de feuilles persistantes, pouvant se ressemer abondamment. Plein soleil, sol sec, -15°C. Massif, prairie naturelle, talus. 3 /m2

code tarif **D**

Achillea coarctata

famille : **Asteraceae**

milieu : Bord de route, prairie sèche

géo : Sud de l'Europe, nord de la Grèce

Persistante de 5 à 15 cm de hauteur, longues feuilles grises et découpées. Plante qui drageonne et se développe en tapis compact. Fleurs jaune soutenu du printemps à l'automne en corymbes compactes de 30 à 60 cm de hauteur. Soleil, sol pauvre, sableux ou argileux, résistant à la sécheresse. 15°C. Couvre sol, massif, jardin de gravier. 5 /m2

code tarif **D**

Achillea cretica

famille : **Asteraceae**

milieu : falaise et talus rocheux, rocaille

géo : Crète

Coussin érigé au feuillage finement découpé, vert soutenu, épais et persistant. Fleurs en ombelles blanches en avril et mai. Soleil, sol rocailleux. -12°C. Rocaille, talus massif, jardin naturel. 5/m2

ode tarif **E**

Achillea falcata

famille : **Asteraceae**

syn. : *Achillea chamaemelifolia* var. *falcata*,

Achillea sulphurea.

milieu : steppes, montagnes arides

géo : Turquie, Liban, Iraq, Palestines, Israël, Syrie

Feuillage très découpé, vert sombre de 2 à 5 cm de hauteur. La plante se développe en tapis. Floraison de 30 cm de hauteur en corymbes de fleurs jaune clair d'avril à juillet. Soleil, sol pauvre et caillouteux, rocaille, massif, jardin naturel. -15°C. 5 /m2

code tarif **E**

Achillea filipendulina

famille : **Asteraceae**

milieu : prairie

géo : Caucase

Touffe de feuillage vert, découpé et parfumé, caduc en hiver. Floraison d'ombelles jaune vif en début d'été dressé sur des tiges de 1m à 1,20m. Soleil, mi-ombre, tout sol, rocaille, massif, jardin naturel. -15°C

code tarif **D**

Achillea fragrantissima

famille : Asteraceae

milieu : steppe

géo : Syrie, Palmir, Iran, Turquie, Egypte, Liban

Touffe de feuillage gris très odorant, de 50 à 70 cm en tout sens. Ombelle de fleurs jaune soutenu de mai à août. Soleil, sol pauvre, sableux ou argileux, rocaille, jardin naturel. 15°C. 4 /m2

code tarif F

Achillea millefolium 'Terracotta'

famille : Asteraceae

géo : Horticole

Touffe de feuillage dense, gris vert, dentelé de 5 cm de hauteur environ, couvre sol. Fleurs variant du jaune cuivré au jaune pâle en été, 50 à 60 cm de hauteur. Soleil, -15°C. Soleil, massif, rocaille. 6 /m2

code tarif D

Achillea x kellereri

famille : Asteraceae

milieu : hybride de A.ageratifolia x

géo : Horticole

Coussin aux feuilles grises très finement découpées, d'une hauteur en fleur de 15 à 25 cm et d'une largeur identique. La floraison blanche est printanière. Plante de terrain bien drainé craignant les excès d'eau. Plein soleil, sol calcaire rocailleux. Rocaille, bord de mur. -20°C, 5 à 8/m2

code tarif E

Achillea odorata

famille : Asteraceae

milieu : pelouse sèche, garrigue

géo : Méditerranée, sud de la France , Grèce

Le feuillage fin est découpé, les rosettes de feuilles ne dépasse pas les 2 à 3 cm. La souche est rampante et forme de beaux tapis très robustes. Soleil, sol argilo calcaire. -20°C. couvre sol, jardin de gravier.

code tarif D

Achillea taygetea

famille : Asteraceae

milieu : prairie rocailleuse, rocaille et falaise calcaire, entre 1400 et 2100m au Mont Taygetos et Parnon

géo : Grèce,

Petite achillée au feuillage gris vert tomenteux, drageonnant. Floraison jaune vif à la fin du printemps, début d'été. Soleil, sol rocailleux, bien drainé. Rocaille, couvre sol, -15°C, 5/m2

code tarif E

Achillea teretifolia

famille : Asteraceae

syn. : A. wilhelmsii A.santolina Achillea eriophora

milieu : Sultan Dag 2000m,steppe, champs entre 500 & 2200m

géo : Turquie, Iran, Pakistan, Afghanistan, Syrie

Petite achillée de 15 à 30 cm de hauteur au feuillage gris vert laineux, persistant. Floraison en corymbe blanc crème. Soleil, massif, rocaille, -15°C. 6 /m2

code tarif F

Achillea umbellata

famille : Asteraceae

milieu : rocaille calcaire

géo : Grèce , Péloponèse

Coussin étalé au feuillage découpé gris argent de 5 cm de hauteur sur 30 cm de large. Floraison blanche en ombelle d'une 15 de cm au printemps. Soleil, sol bien drainé. -15°C. Rocaille, massif, couvre sol.

code tarif E

Aethionema cretica

famille : Brassicaceae

milieu : pelouse rocailleuse, falaise calcaire

géo : Crète

Vivace à la base ligneuse formant un petit coussin compact en sol pauvre, 10 cm de hauteur x 20 cm de largeur. Feuillage coriace bleuté. Floraison printanière blanc rosé. Plein soleil, sol bien drainé. - 15°C. 6 /m2

code tarif E

A **Allium tuberosum**

famille : **Alliaceae**

milieu : Très largement cultivé, il se trouvait à l'origine parmi les arbustes, province de Shanxi entre 1000 et 1100m d'alt.

géo : Chine

Ciboule chinoise, Garlic chives- Petite touffe de feuillage érigé de 30 à 40 cm en tout sens. La feuille est étroite, plate d'un beau vert tendre et très aromatique d'ail. Inflorescence composée de fleurs blanches en étoiles à la fin de l'été. Soleil, mi-ombre, -15°C. Massif, jardin de gravier, jardin aromatique et naturel.

code tarif **D**

Alyssoides utriculata

famille : **Brassicaceae**

milieu : Rochers, falaises

géo : Sud de l'Europe, Balkans

Coussin de feuilles coriaces de 10 à 15 cm. Fleurs de 20 à 40 cm de hauteur, jaunes en avril mai, suivies de fruits très décoratifs en forme de billes translucides. Soleil, sol bien drainé et sec, rocaille, -15°C. 6 /m2

code tarif **D**

Aphyllanthes monspeliensis

famille : **Asparagaceae**

syn. : *Aphyllanthes caerulea* *Aphyllanthes cantabrica*

milieu : pelouses sèches, rocailles, soleil, marne et calcaire entre 50 et 1700m alt.

géo : Italie, Espagne, France, Portugal, Afrique du Nord

Petite touffe dense de 10 à 25 cm de hauteur et de 30 à 40 de largeur, aux tiges grêles, sans feuilles, rappelant une graminée. Fleur bleu porcelaine en forme d'étoile à l'extrémité des tiges, d'avril à juillet. Rocaille, jardin naturel, soleil, mi-ombre. 5 /m2

code tarif **E**

Arabis drabiformis

famille : **Brassicaceae**

milieu : Mont Ulu Dag, rocaille, pente, 2000 à 2150m d'alt

géo : Turquie

Coussinet de 10 cm de hauteur par 20 à 30 cm de large. Feuillage vert, persistant. Petite fleurs blanches au printemps. Soleil, -15°C, Rocaille.

code tarif **E**

Artemisia abrotanum

famille : **Asteraceae**

milieu : plaine, friche

géo : Sud de l'Europe, Syrie, Cappadoce, ItalieTurquie, Arménie, est de l'Anatolie

Aurone

Feuillage fin, très découpé vert et gris, aromatique à l'odeur citronnée, 1 m en tous sens, fleurs insignifiantes en été. Plein soleil, doit être rabattu au début du printemps, -15°C. 5 /m2

code tarif **D**

Artemisia abrotanum 'Argentea'

famille : **Asteraceae**

milieu : friche, bord de chemin

géo : Sud de l'Europe

Feuillage très fin, découpé gris argenté, aromatique en coussin de 20 cm en tout sens, 20 à 40 cm en fleur. Petites fleurs jaunes en début d'été. Soleil, massif, jardin naturel. -15°C. 5 /m2

code tarif **D**

Artemisia absinthium

famille : **Asteraceae**

milieu : friches, lieux incultes et arides, pentes rocheuses

géo : Sud de l'Europe, Afrique du Nord

Grande absinthe

Feuillage gris vert, découpé, très aromatique, 30 à 40 cm de largeur, 20 à 30 de hauteur. 1m dans tous les sens en fleur. Fleurs insignifiantes jaunâtres en été. Plein soleil, sol sec mais profond, -15°C. 5 /m2. Jardin d'aromatique, jardin naturel, massif

code tarif **D**

Artemisia afra

famille : **Asteraceae**

milieu :

géo : Afrique du sud

Feuillage découpé gris vert, persistant, très aromatique de 60 cm à 1,50 m, port dressé et rigide. Fleurs insignifiantes en été. Soleil ou mi-ombre, -12°C, -15°C. 3 /m2

code tarif **D**

Artemisia albafamille : **Asteraceae**syn. : *Artemisia camphorata*

milieu : pelouse rocailleuse pelouses basophiles subp/supraméditerranéenne, mésoxérophiles,

géo : Sud de l'Europe Afrique du Nord

Plante au port en boule de 20 à 50 cm de hauteur, feuillage vert foncé, semi-persistant très parfumé. L'odeur rappelle celle du camphre. Rabattre au début du printemps. Soleil, bonne résistance au sec, - 20°C. 3 /m2

code tarif **D****Artemisia canescens**famille : **Asteraceae**syn. : *A.armeniaca*

milieu :

géo : origine incertaine

Armoise de 20 à 30 cm de hauteur, feuillage gris, frisé ressemblant à du lichen, aromatique, sèche en hiver. Plein soleil, très bon comportement à la sécheresse, -15°C. 3 à 5 /m2

code tarif **D****Artemisia herba-alba**famille : **Asteraceae**

milieu : steppe, colline rocailleuse en zone subdésertique

géo : Afrique du Nord, sud de l'Espagne, Turquie, Iran, Israël

Armoise herbe blanche - Plante de 20 à 50 cm de hauteur en fleur. Feuillage gris vert très fin, très aromatique. Floraison jaunâtre en été, rabattre en fin de floraison. Plein soleil, sol bien drainé, -15°C. 3 /m2

code tarif **E****Asphodeline liburnica**famille : **Asphodelaceae**

milieu : prairies sèches, zones rocailleuses

géo : Bassin méditerranéen

Feuillage fin, érigé de 30 à 40 cm en fleur. Floraison jaunes en épis portées par des tiges fines en juin, s'ouvrant en fin de journée. Racines charnues, plante entrant en repos après floraison en été. Plein soleil, sol drainé, sec en été, - 15°C. 5 /m2. Massif, jardin et prairie naturel.

code tarif **D****Asphodeline lutea**famille : **Asphodelaceae**

milieu : pelouse sèche, steppe,

géo : Afrique du Nord, ouest de la Méditerranée

Bâton de Jacob

Feuillage épais érigé, vert, racines charnues. Inflorescence jaune d'or en épis de 60 à 80 cm de hauteur de juin à juillet. Soleil, résistant à la sécheresse, sol drainé, -15°C. 5 /m2. Massif, jardin et prairie naturel.

code tarif **D****Asphodeline taurica**famille : **Asphodelaceae**

milieu : rocailles, prairies caillouteuses

géo : Turquie Grèce

Plante formant une rosette de feuillage gris bleuté d'environ 20 cm de diamètre, persistante. Hampe florale de 70 cm portant de fines fleurs blanches au printemps. Plante bisannuelle. Soleil, massif, rocaille, talus, jardin naturel, - 15°C. 6 à 8 /m2

code tarif **E****Asphodelus acaulis**famille : **Asphodelaceae**

milieu : Montagnes de l'Atlas, pelouses rocailleuses

géo : Afrique du Nord

Large rosette basse aux fines feuilles vertes. La floraison étoilée s'épanouit au centre de cette rosette. Les pétales roses sont traversées dans le sens de la longueur par une bande verte. Soleil, -12°C. Rocaïlle, massif, talus.

code tarif **G****Asphodelus aestivus**famille : **Asphodelaceae**syn. : *Asphodelus ramosus*

milieu : Prairie sèche, steppe, garrigue, rocaïlle.

géo : Méditerranée, ouest de l'Anatolie, Turquie

Rosette de feuilles vertes. Les hampes florales sont vigoureuses et nombreuses d'une hauteur d'1 à 1,50m. Les fleurs blanches en étoile sont veinées d'une rayure centrale marron. Soleil, sol pauvre et bien drainé, -15°C. Massif, jardin et prairie naturel.

code tarif **E**

A **Asphodelus albus**
 famille : **Asphodelaceae**
 milieu : pelouse, prairie, bois, garrigue maquis
 géo : Europe méditerranéenne
 Rosette de feuilles linéaires, vertes, disparaissant en été. La floraison érigée est presque toujours portée sur une tige unique. Fleurs blanches. Soleil, sol pauvre et bien drainé. - 15°C. Massif, prairie naturelle, isolé.

code tarif **E**

Asphodelus fistulosus

famille : **Asphodelaceae**
 milieu : friche, grève de cours d'eau, bord de route
 géo : Bassin méditerranéen, sud de l'Europe, Turquie
 Petite touffe de feuillage linéaire vert de 10 à 15 cm de largeur, persistante. Hampe florale de 20 à 50 cm de hauteur portant de fines fleurs blanches au printemps. Peut se ressemer abondamment pour former de grands tapis. Soleil, massif, rocaille, talus, couvre sol. - 15°C. 6 à 8 /m2

code tarif **D**

Asphodelus ramosus ssp. ramosus

famille : **Asphodelaceae**
 syn. : *A. microcarpus*
 milieu : Maquis, milieu ouvert, prairie paturée
 géo : Méditerranée, Corse
 Rosette de feuille basse, verte. Plante à la racine tubéreuse. Hampe florale longue et ramifiée, inflorescence dense, blanche. Sol argilo-calcaire bien drainé, soleil, -12°C. Massif, prairie et jardin naturel.

code tarif **E**

Ballota acetabulosa

famille : **Lamiaceae**
 milieu : zone inculte, désertique, roche, éboulis calcaire, ruine Parnass 1200m
 géo : Grèce, Turquie, Crète
 Feuillage persistant, laineux, gris blanchâtre formant un gros coussin de 40 à 50 cm en tout sens. Très petites fleurs roses entre mai et juillet. Plein soleil, sol pauvre et caillouteux -12°C. massif, rocaille, couvre sol. 3 à 5 /m2

code tarif **D**

Ballota hirsuta

famille : **Lamiaceae**
 milieu : fourrés, friches, bord de chemin
 géo : Espagne, Portugal
 Ballote aux tiges dressées de 50 à 80 cm en tout sens. Feuillage laineux, vert olive, grandes feuilles ovales, tiges boisées aux couleurs plus ou moins brun orangé. Petites fleurs blanc rosé, discrètes de juin à juillet. Plein soleil, très bonne tenue à la sécheresse, Massif, rocaille, jardin naturel, 3 /m2 , -15°C

code tarif **D**

Ballota hispanica

famille : **Lamiaceae**
 syn. : *Marrubium hispanica* *Ballota rupestris*
 milieu : falaise calcaire, ravin, 0 à 1500m d'alt.
 géo : Espagne, Italie, Croatie
 Ballote d'Espagne
 Feuillage vert clair, de forme triangulaire, les feuilles et les tiges sont très velues. Floraison blanc rosé, discrète. Plante de plein soleil en sol bien drainé. Massif, rocaille, jardin naturel, 3 à 5 /m2 , -15°C.

code tarif **E**

Ballota pseudodictamnus

famille : **Lamiaceae**
 milieu : sol calcaire caillouteux, colline
 géo : Grèce, Crète
 Feuilles rondes, duveteuses, grises claires presque blanches formant un coussin de 50 cm de hauteur et 60 cm à 1 m de largeur, persistant. Petite fleur rose au printemps. Plein soleil, tout sol bien drainé, rocaille, talus, jardin naturel, couvre sol -15°C. 3 /m2

code tarif **D**

Ballota undulata

famille : **Lamiaceae**
Marrubium undulatum milieu : steppe arbustive, désert
 géo : Israël, Liban
 Petit arbuste de 50 cm dans tous les sens, au feuillage ondulé, duveteux de couleur vert olive, persistant. Fleur très petite blanc rosé en fin de printemps. Plein soleil. -10 à -12°C, rocaille, talus, jardin naturel, 3 /m2

code tarif **F**

Brunella hyssopifolia

famille : Lamiaceae

syn. : *Prunella hyssopifolia*

milieu : sur marne calcaire

géo : Europe du sud

Couvre-sol persistant aux feuilles vert foncé, linéaires à une seule nervure. Epis de 10 à 15 cm de hauteur de fleurs rose violacé sortant du feuillage au printemps. Soleil, sol bien drainé, -20°C, 6/m2. Rocaille, couvre sol.

code tarif D

Bupleurum spinosum

famille : Apiaceae

milieu : 1200m d'alt, végétation basse et ouverte dans les montagnes andalouses, pentes et crêtes caillouteuses, landes calcaires

géo : Espagne, Maroc

Coussin très compact légèrement épineux 20 à 30 cm de hauteur 40 à 60 de largeur. Feuillage vert linéaire. Floraison d'ombelles jaune vert en été. Soleil, sol bien drainé et rocailleux, rocaille, jardin naturel, couvre sol. -15°C. 5/m2

code tarif F

Calylophus greggii

famille : Onagraceae

milieu :

géo : Ouest des USA

Oenothère arbustive, atteignant 20 cm en tout sens. Petites feuilles vertes persistantes, linéaires. Floraison jaune, fleur large à l'aspect froissée. Plein soleil, sol bien drainé. -15°C. Rocaille, bord de muret

code tarif E

Capparis spinosa

famille : Capparaceae

milieu : colline rocailleuse, ruine, bord de chemin

géo : Espagne, Italie, Croatie

Câprier

Buisson épineux aux tiges caduques lâches de 1m à 3 m dans tous les sens. Feuilles arrondies et épaisses, vertes glauques, caduques. Fleurs blanc crème munies de longues étamines violacées. Plein soleil, sol très drainant, bord de restanques, rocailles, éboulis, talus. -15°C.

code tarif F

Carthamus arborescens

famille : Asteraceae

syn. : *Kentrophyllum arborescens* *Phonus arborescens*

milieu : bord de chemin, plante rudérale

géo : Espagne, Afrique du Nord

Chardon pouvant atteindre 2,50 m, ligneux et ramifié à la base, à l'odeur marqué de musque animal. Feuilles dentées, épineuses, vertes, coriaces, persistantes. Nombreuses fleurs aux bractées piquantes et aux pétales jaune safran au printemps. Plein soleil, sol très drainant, bord de muret, rocaille, éboulis, talus. -15°C. 1 /m2

code tarif E

Capparis spinosa var.inermis

famille : Capparaceae

milieu : ruine, bord de chemin, muret, colline rocailleuse

géo : bassin méditerranéen

Câprier sans épines. Buisson aux tiges caduques lâches de 1m à 3 m dans tous les sens. Feuilles arrondies et épaisses, vertes glauques, caduques. Fleurs blanc crème munies de longues étamines violacées. Plein soleil, sol très drainant, bord de restanques, rocailles, éboulis, talus. -15°C.

code tarif F

Catananche caerulea

famille : Asteraceae

milieu : pelouse sèche, friche

géo : Sud de la France, Espagne, Italie

Rosette de feuillage produisant des fleurs bleues en juin juillet. Floraison atteignant 40 à 50 cm de hauteur. Fruits sec décoratifs. Très résistant à la sécheresse, soleil ou mi-ombre légère, -15°C. 6 /m2

code tarif D

Catananche caerulea 'Alba'

famille : Asteraceae

milieu :

géo :

Identique au précédent mais la fleur est blanche.

code tarif D

C **Centaurea argentea** **ssp.chionantha**



famille : **Asteraceae**

milieu : parois rocheuse

géo : Crète

Coussinet de feuillage gris clair, très découpé de 20 à 50 cm de diamètre, persistant. Floraison blanc crème lavé de rose soutenu en fin de printemps. Sol bien drainé et pauvre sinon la plante ne vit pas longtemps. Plein soleil, très résistante à la sécheresse, -12°C. rocaille, jardin naturel,

code tarif **E**

Centaurea argentea



famille : **Asteraceae**

milieu : rocaille calcaire

géo : Crète

Coussinet de feuillage gris argenté, découpé comme une dentelle de 20 à 50 cm de diamètre, persistant. Floraison jaune beurre clair au printemps. Sol bien drainé et pauvre sinon sa longévité est raccourci. Plein soleil, très résistante à la sécheresse, -12°C. rocaille, jardin naturel, bord de muret.

code tarif **E**

Cerastium tomentosum **var.aetnensis**



famille : **Caryophyllaceae**

milieu : pente de l'Etna

géo : Sicile

Coussinet compact aux petites feuilles cotonneuses, gris argenté, persistant, de 5 à 15 cm de hauteur. Fleurs blanches très légères au printemps. Plein soleil, sol bien drainé. Rocaille, couvre sol. - 15°C. 5 /m2

code tarif **E**

Centaurea behen

famille : **Asteraceae**

milieu : champs et pentes rocailleuses

géo : Iran, Turquie, Israël

Rosette de larges feuilles vertes, verte lisse pouvant atteindre 40 cm de diamètre. Hautes tiges ramifiées portant des fleurs solitaires jaunes, de 1 à 2m de hauteur, au printemps. Soleil, massif, rocaille, -15°C. 5/m2

code tarif **F**

Centaurea bella

famille : **Asteraceae**

milieu :

géo : Caucase

Plante à port rampant de 10 à 15 cm de hauteur au feuillage persistant gris vert, floraison rose d'avril à mai. Bon couvre sol en sol pauvre. Plein soleil, résistante à la sécheresse, -15°C. 6 /m2. Massif, bordure, couvre sol, rocaille

code tarif **D**

Centaurea cineraria

famille : **Asteraceae**

syn. : *Centaurea cinerea*

milieu : Falaises et rochers maritimes, entre 0 et 100m d'alt.

géo : Dalmatie, Italie

Anciennement dénommé *Centaurea pulcherrima*. Boule de feuillage argenté très découpé de 60 à 80 cm de diamètre, persistant, à croissance rapide. Floraison rose en fin de printemps. Sol bien drainé et pauvre sinon la plante ne vit pas longtemps. Plein soleil, très résistante à la sécheresse, mais fragile au froid -8°C. Massif, rocaille, jardin naturel, 1 à 2 /m2

code tarif **D**

Centaurea ragusina ssp.ragusina

famille : **Asteraceae**

milieu : colline, pente rocailleuse

géo : Dalmatie

Plante de 40 à 60 cm dans tous les sens au feuillage très blanc, persistant au port compact. Floraison jaune en juin juillet. Sol très bien drainé pour une bonne longévité et un aspect compact. Plein soleil, très résistante à la sécheresse, rocaille, jardin naturel, -15°C. 5 /m2

code tarif **E**

Centaurea spinosafamille : **Asteraceae**milieu : Dune à *Ammophila arenaria*, côte sableuse et rocaillieux, parfois accompagnés de *sarcopoterium spinosum* et *Euphorbia acanthoclada*

géo : Grèce, Crète, ouest de l'Anatolie, Dardanelle

Superbe coussin de 20 à 40 cm de hauteur sur 80 cm à 1m de diamètre. Fleurs blanches ou jaunes avec l'extrémité des pétales violets en juin juillet. Forme un coussin épineux très compact de feuilles grises. Rocaille, bord de muret, plein soleil, sol sec et bien drainé, - 15°C. 1 /m2

code tarif **F****Centranthus lecoqui**famille : **Valerianaceae**syn. : *Centranthus angustifolius subsp. lecoqui*

milieu : Eboulis, fissure de roche, terrain perturbé au substrat calcaire, entre 300 et 1800m alt

géo : Espagne, Sud de la France

Vivace de 20 à 70 cm de hauteur en fleur, aux feuilles très fines et linéaires, gris vert. Floraison rose violacé de mai à août. Plein soleil, rocaille, bord de muret, jardin naturel, - 15°C. 3 /m2

code tarif **E****Centranthus ruber 'Albus'**famille : **Valerianaceae**

milieu : bord de chemin, vieux murs, rochers, restanque

géo : Sud de l'Europe

Forme de centranthe à floraison blanche.

code tarif **D****Centranthus ruber**famille : **Valerianaceae**

milieu : vieux murs, bord de chemin, rochers,

géo : Sud de l'Europe

Lilas d'Espagne

Vivace de 60 cm à 1 m de hauteur, floraison rouge foncé de mai à juillet remonte en fin d'été. Peut se ressemer au jardin. Très résistante à la sécheresse, plein soleil, massif, bord de muret, jardin naturel, - 15°C. 3 /m2

code tarif **D****Centranthus ruber 'Mauve'**famille : **Valerianaceae**

milieu : rochers, bord de chemin, vieux murs

géo : Sud de l'Europe

Forme à la floraison mauve.

code tarif **D****Cephalaria ambrosioides**famille : **Dipsacaceae**

milieu : garrigue, pentes sèches et caillouteuses entre 400 et 1600m d'alt.

géo : Grèce, Balkans

Grande vivace d'1 à 1,50m de hauteur. Rosette aux feuilles lobées, vertes. Multiples tiges érigées portant des fleurs globuleuses blanc crème à jaune pâle en fin de printemps début d'été. Soleil, sol bien drainé, -15°C. Massif de vivaces, prairie naturelle.

code tarif **D****Cephalaria leucantha**famille : **Dipsacaceae**

milieu : garrigue, parois rocheuse, éboulis calcaire, pelouse rocaillieuse entre 50 et 1200m d'alt

géo : Bassin méditerranéen

Vivace au feuillage découpé vert franc, ligneuse à la base. Fleurs blanches des scabieuses portées sur de hautes tiges de 80 cm à 1m, très graphique. Floraison en fin de printemps. Plein soleil, massif, jardin naturel, -15°C. 5 /m2

code tarif **D****Ceratostigma griffithii**famille : **Plumbaginaceae**

milieu :

géo : Himalaya

Feuillage vert foncé rougissant au premier froid, caduc. Port arbustif de 60 à 80 cm. Petite fleur bleu vif en fin d'été et à l'automne. Rabattre en fin d'hiver. Soleil, résistante à la sécheresse, - 15°C. Massif, rocaille, 3 /m2

code tarif **D**

C Ceratostigma plumbaginoides

famille : Plumbaginaceae

milieu : pied des collines rocailleuses

géo : Chine

Plumbago rampant

Feuillage caduc, vert rougissant à l'automne. Bon couvre sol de 10 à 20 cm de hauteur. Fleur bleue de la mi août à la fin de l'automne. Plein soleil ou mi-ombre, très résistant à la sécheresse, -15°C. 8 /m2

code tarif **D**

Chicorium spinosum

famille : Asteraceae

milieu : Crevasses, zones rocailleuses en bord de côtes.

géo : Crète, Malte

Chicorée épineuse

Coussin épineux de 10 à 15 cm de ht 20 à 30 de diamètre à rameaux entremêlés. Les feuilles vertes à la base, légèrement charnues sont comestibles. Floraison bleu vif de mai à juillet. Soleil, sol rocailleux et bien drainé, rocaille pauvre indispensable pour réussir sa culture. -15°C. 3 à 5 m2

code tarif **F**

Clematis integrifolia

famille : Ranunculaceae

milieu : prairie

géo : Balkans, Europe du sud

Clématite herbacée de 40 cm de diamètre et 40 à 60 de hauteur, feuillage vert foncé brillant, caduc en l'hiver. Petite fleur bleu profond au printemps et début d'été. Plein soleil, arrosage régulier pour allonger la floraison pendant l'été - 15°C. 5 /m2

code tarif **F**

Clinopodium nepeta

famille : Lamiaceae

syn. : *Calamintha nepeta*

milieu : friche, bord de chemin, pelouse sèche

géo : Europe, région méditerranéenne

Calament - Petite vivace de 15 à 20 cm de hauteur au feuillage gris vert, développant une odeur de mentholé lorsqu'il est froissé. Floraison s'élève au dessus du feuillage et forme un nuage de fleur bleu clair en fin de printemps et été. Soleil, couvre sol, jardin naturel, rocaille. -15°C - 6 à 8 / m2

code tarif **D**

Coronilla minima

famille : Fabaceae

milieu : friche, rocaille, pelouse sèche,

géo : Bassin Méditerranéen

Petit coussin étalé de 15 cm à 50 cm, persistant. Petite feuille pennée vert glauque. Floraison jaune en couronnes au printemps. Soleil, sol rocailleux, rocaille, jardin naturel, -15°C.

code tarif **D**

Coronilla globosa

famille : Fabaceae

milieu : failles fraîches des falaises, talus

géo : Crète

Petit buisson de 1m en tous sens au feuillage caduc en été. Feuilles vertes composées de 10 folioles. Floraison blanche en capitule ronde de 3 à 6 cm de diamètre. Ombre à mi-ombre, demande un sol frais. -12°C. Rocaillie, mur, talus, massif.

code tarif **G**

Coronilla minima ssp. lotoides

famille : Fabaceae

milieu : rocaillie, pelouse sèche, friche

géo : Bassin Méditerranéen Europe

Touffe de 15 cm à 30 cm formant un petit coussin, persistant. Floraison jaune en couronnes au printemps. Soleil, sol rocaillieux, rocaillie, jardin naturel, -15°C. 5/m2

code tarif **D**

Convolvulus cneorum

famille : Convolvulaceae

milieu : pente rocheuse calcaire

géo : Espagne, Italie, Croatie, Albanie

Coussin de 60 par 60 cm, au feuillage persistant gris argenté. Fleur de liseron blanc à blanc rosé au printemps et remonte parfois en automne. Plein soleil, sol sec et bien drainé, rocaille, bord de muret, massif, - 12°C.5 /m2

code tarif **D****Convolvulus mauritanicus**

famille : Convolvulaceae

syn. : *C. sabatius*

milieu : rocaille calcaire, de 0 à 300 m d'alt.

géo : Afrique du Nord/Italie

Vivace couvre-sol au feuillage semi-persistant en climat doux. Fleur de liseron d'un bleu intense au printemps et remonte en automne. Plein soleil, potée, rocaille, bord de muret, bordure. Nécessite de l'arrosage pour une floraison estivale, - 12°C.5 /m2

code tarif **D****Convolvulus oleifolius**

famille : Convolvulaceae

milieu : rocaille calcaire, phrygana, 0 à 300m d'alt

géo : Grèce, Crête

Petit buisson prostré de 10 cm par 50 cm de large. Feuille linéaire, gris argenté, duveteuse, rappelant une feuille d'olivier. Fleur rose clair au printemps. Soleil - rocaille, jardin de gravier. -12°C.

code tarif **F****Crithmum maritimum**

famille : Apiaceae

milieu : falaise rocailleuse de bord de mer

géo : Méditerranée

Criste-marine

Coussin persistant de 10 à 20 cm de hauteur, aux feuilles vertes charnues et comestibles. Floraison d'ombelles vert à vert blanc crème en été. Plein soleil, sol caillouteux, rocaille, bord de muret, -15°C. 5 à 8 /m2

code tarif **D****Dimorphoteca cuneata 'Orange'**

famille : Asteraceae

milieu : Prairie ,

géo : Afrique du sud

forme à fleur orange du *Dimorphoteca cuneata*code tarif **E****Dorycnium pentaphyllum ssp gracile**

famille : Papilionaceae

syn. : *Dorycnium gracile*

milieu : matorrale, sansouire

géo : Pourtour méditerranéen occidentale

Grande vivace au port dressée et souple de 70 cm à 1,20 m en tout sens. Petite feuille gris argenté, persistante. Floraison blanche en fin de printemps, très mellifère. Soleil, rocaille, prairie naturelle, massif, jardin naturel, -12°C.

code tarif **E****Delosperma cooperi**

famille : Aizoaceae

milieu : prairie, habitat rocheux sur les hauts plateaux de montagnes

géo : Afrique du sud

Plante de 5 à 10 cm de hauteur, feuillage succulent persistant, rougissant avec le froid. Floraison rose violacé intense de juin à septembre. Couvre sol dense, retombant. Plein soleil, résistant à la sécheresse, potée, rocaille, bord de muret, bordure, -15°C. 5 à 8 /m2

code tarif **D****Dianthus anatolicus**

famille : Caryophyllaceae

milieu : pente rocailleuse

géo : Turquie, Pakistan

Vivace formant un coussin au feuillage bleuté de 5 à 10 cm de hauteur et de 30 à 40 cm de largeur. Floraison blanche à rosée, parfumée, en fin de printemps. Plein soleil, rocaille, bordure, massif, -15°C. 5 /m2

code tarif **D**

D **Dianthus carthusianorum**

famille : Caryophyllaceae

milieu : colline pierreuse, pelouse sèche

géo : Europe, Afrique du Nord

.....
Ceillet des Chartreux

Petite touffe de feuillage fin, vert soutenu, persistant. Fleurs roses magenta portées sur de hautes tiges de 20 à 50 cm du printemps à la fin de l'été. Plein soleil, résistant à la sécheresse, bordure, rocaille, -15°C. 8 /m2

code tarif **D**

Dianthus corsicus

famille : Caryophyllaceae

syn. : *Dianthus caryophyllus*

milieu : coteaux arides, rochers, murs

géo : Méditerranée, Corse, Algérie, Maroc

Très petite touffe de feuillage gris bleuté compact, persistant ne dépassant pas les 10 cm de hauteur. Floraison rose vif, parfumée au printemps. Soleil, rocaille, massif, demande des sols pas trop sec en été. -12°C. 8/m2

code tarif **E**

Dianthus erinaceus

famille : Caryophyllaceae

milieu : alt 800 à 1000m, pente rocailleuse

géo : Turquie, ouest de l'Anatolie

Coussin de feuillage persistant, vert très serré ressemblant à un hérisson. Hauteur 10 cm largeur 10 à 20 cm. Petite fleur rose soutenu au printemps. Soleil, rocaille, massif, pot, -15°C. 8/m2

code tarif **E**

Dianthus libanotis

famille : Caryophyllaceae

milieu : Kavusahap Dag 2300m d'alt. Zones semi-désertiques, pentes sèches et rocailleuses

géo : Turquie, Palestine, Israël, Syrie, Arménie

Large rosette de feuilles gris bleuté, coriace, persistante, légèrement ondulées. Grande fleur blanc crème moucheté de mauve à la base des pétales, parfumée, 60 à 80 cm en fleur au printemps. Plein soleil, sol bien drainé, rocaille, éboulis. -15°C. 5 /m2

code tarif **F**

Dianthus lumnitzeri

famille : Caryophyllaceae

syn. : *Dianthus praecox ssp. lumnitzeri*

milieu : Tuff, affleurement rocheux, colline calcaire, prairie sèche

géo : R.Tchèque, Autriche, Hongrie, Slovaquie

Petit coussin compact de 5 à 10 cm de hauteur au feuillage gris bleuté, persistant. Floraison blanche parfumée en avril, mai, atteignant 15 cm. Très résistant à la sécheresse, sol caillouteux, plein soleil, rocaille indispensable, -15°C. 8 /m2

code tarif **E**

Dianthus lusitanicus

famille : Caryophyllaceae

syn. : *D. lusitanus*

milieu : rochers et éboulis

géo : Espagne, Maroc

Petite coussin de feuillage vert, de 5 cm de hauteur 10 cm de largeur, persistant. Floraison rose vif au printemps. Soleil, rocaille, massif, -15°C.

code tarif **E**

Dianthus noeanus

famille : Caryophyllaceae

syn. : *Dianthus petraeus subsp. noeanus*

milieu : pente rocailleuse,

géo : Grèce, Bulgarie, Croatie (péninsule des balkans)

Petit coussin compact au feuillage vert, presque épineux. Fleur solitaire blanche aux pétales frangés, odorant à la fin du printemps. Rocaille, plein soleil, sol sec et bien drainé, -15°C. 5 à 8 /m2

code tarif **E**

Dianthus tianschanicus

famille : Caryophyllaceae

milieu : gravier alluvionnaire

géo : Asie Centrale, Kyrzysstan

Tapis de 5 à 10 cm de hauteur par 40 cm de largeur au feuillage linéaire vert bleuté, persistant. Petites fleurs roses aux pétales frangés au printemps. Soleil, massif, rocaille, jardin naturel, -15°C. 5 à 8 /m2

code tarif **E**

Digitalis lutea

famille : **Scrophulariaceae**

milieu : lisières de forêts claires, pentes, éboulis, pieds de falaises

géo : Ouest et centre de l'Europe

Plante vivace en rosette de feuillage vert foncé coriace. Elle atteint de 70 cm à 1,20 m lors de la floraison, fleurs jaune clair en mai juin. Mi-ombre, très bonne résistance à la sécheresse, - 20°C. 8 /m2

code tarif **D**

Digitalis nervosa

famille : **Scrophulariaceae**

syn. : *Digitalis laevigata*

milieu : forêt ouverte de genévriers et de chênes, bord de chemin, de 900 à 2000m d'alt.

géo : Asie MineureTurquie, Iran

Grande rosette de feuillage persistant, très coriace, vert mat. Fleur marron ocre en début d'été, de 0,60 à 1,20 m de hauteur. Mi-ombre, soleil, résistante à la sécheresse, - 20°C. 5 /m2

code tarif **F**

Digitalis obscura

famille : **Scrophulariaceae**

milieu : broussailles sèches, pentes rocheuses, crevasses sur roches calcaires

géo : Afrique du Nord, Espagne

Plante ligneuse développant des tiges de 30 à 60 cm de hauteur. Feuillage persistant coriace, vert, rougissant légèrement en hiver. Fleur composée d'un mélange de rouge, de marron, de jaune et d'orange au printemps. Soleil, mi-ombre, -12°C. Massif, prairie naturelle, rocaille

code tarif **E**

Dimorphanthea cuneata

famille : **Asteraceae**

milieu : prairies, zone semi-arides des fynbos (garrigue)

géo : Afrique du sud

Plante de 30 à 90 cm de hauteur, compacte. Feuillage coriace, persistant, vert foncé. Floraison blanche en forme de grosse marguerite en fin d'hiver. Plein soleil, tout sol, rocaille, massif. - 12°C. 4 /m2

code tarif **E**

Dittrichia viscosa

famille : **Asteraceae**

syn. : *Inula viscosa*

milieu : friche, bord de route, grève de cours d'eau entre 25 et 400m d'alt.

géo : Europe, région méditerranéenne

Grande vivace de 70 cm à 1 m en tout sens. formant un petit buisson. Le feuillage vert est visqueux (poisseux) et odorant. Inflorescence allongée couverte de petites fleurs jaune vif en fin d'été. Soleil, mi-ombre légère, -15°C. Prairie naturelle, massif, couvre sol

code tarif **D**

Dorycnium hirsutum

famille : **Papilionaceae**

milieu : garrigue et coteaux arides

géo : Europe du sud

Feuillage persistant gris argenté de 60 à 80 cm en tout sens formant un buisson structuré. Floraison blanc rosé en mai juin. Soleil ou mi ombre, très résistante à la sécheresse, sol bien drainé -15°C. Massif, rocaille, jardin naturel, 1 à 2 /m2

code tarif **D**

Dorycnium pentaphyllum

famille : **Papilionaceae**

milieu : coteaux arides et secs, garrigue, pentes rocaillieuses

géo : Pourtour méditerranéen, Europe centrale

Coussin persistant de 70 cm à 1 m en tout sens. Petite feuille gris argenté. Floraison blanche en fin de printemps, très mellifère. Elle colonise les lieux incendiés et perturbés. Soleil, sol sec, rocaille, talus, jardin naturel, -15°C. 1 à 2 /m2

code tarif **D**

Echinops ritro

famille : **Asteraceae**

milieu : lieux incultes

géo : Sud de l'Europe, sud de la France, Espagne, Portugal, Italie, Croatie, Algérie, Dalmatie

Feuillage caduc, épineux, vert veiné de blanc. Inflorescence globuleuse bleue en juillet sur des tiges cotonneuses de 10 à 30 cm de hauteur. Plein soleil, très résistante à la sécheresse, utilisée pour les bouquets secs. -15°C. Massif, jardin naturel, 8 /m2

code tarif **D**

E Echinops viscosus subsp. macrolepis

famille : Asteraceae

milieu : garrigue, bois méditerranéen, zone rocailleuse sèche

géo : Grèce, Turquie, Israël

Grosse rosette de feuillage épineux, vert bleuté. De celle-ci se développe de grandes tiges dressées, de 1 à 2m environ portant des capitules de 5 à 7 cm de diamètre blanc argenté terminés par des inflorescences bleues en juillet sur des tiges rougeâtres et poilues. Plein soleil, massif, rocaille, jardin naturel -15°C 5 /m2

code tarif D

Echinops sphaerocephalus

famille : Asteraceae

milieu : bord de chemin, friche xérophile

géo : Europe, Europe centrale, méditerranée

Oursin à têtes rondes. Gros feuillage vert, compact, ramifié, peu épineux, de 40 à 50 cm de hauteur. Inflorescences globuleuses bleu pâle à blanc en juillet. Plein soleil, prairie naturelle, rocaille, -15°C

code tarif D

Echium boissieri

famille : Boraginaceae

milieu : talus, fossé, jachère, terrains rocaillieux, entre 300 et 1300m d'alt

géo : Afrique du Nord, Espagne

Large rosette de feuillage gris vert poilu. Floraison en un épis d'1,20 à 2,50m. Fleurs rose saumoné aux pistils rouges à la fin du printemps, très graphique. Plante bisannuelle qui se resème chaque année, soleil, rocaille, massif, jardin naturel, -15°C.

code tarif E

Echium italicum

famille : Boraginaceae

milieu : lieux arides

géo : Europe, Afrique du Nord

Vipérine d'Italie. Large rosette de feuillage gris vert poilu et rugueux. Floraison en un épis pyramidal de 80 cm. Fleurs blanc rosé à bleuté du printemps, très graphique. Plante bisannuelle qui se resème chaque année, soleil, rocaille, prairie naturelle, jardin naturel, -15°C.

code tarif D

Edraianthus horvatii

famille : Campanulaceae

syn. : *E. graminifolius subsp. graminifolius*

milieu : Galicica 2000m d'alt.

géo : Sud et centre Italie, Sicile, Balkan, ouest et centre Roumanie

Petit coussin compact de feuilles linéaires, vert foncé. De nombreuses fleurs bleues s'épanouissent au dessus du feuillage pour former une boule de fleurs. Soleil, sol très bien drainé, -20°C. Rocaillie, bord de muret.

code tarif E

Erigeron karvinskianus

famille : Asteraceae

milieu : Introduite en Europe au XIX^eS. Elle s'est naturalisée en région méditerranéenne

géo : Mexique

Tapis de feuillage vert foncé, découpé, dense au port large, 15 à 20 cm de hauteur x 30 à 40 cm de largeur. Multitude de petites marguerites blanc rosé du printemps à l'automne, très florifère. Bordure, rocaillie, potée, mi-ombre ou soleil, -12°C. 5 /m2

code tarif D

Erodium manescavi 'Merstham Pink'

famille : Geraniaceae

milieu :

géo : Horticole

Feuillage fin découpé vert soutenu formant un coussin de 15 x 20 cm. Grande fleur rose vif avec une macule violet foncé à la base des pétales, en fin de printemps et été. Soleil, résistant à la sécheresse, rocaillie, massif. -15°C. 5 à 8 /m2

code tarif D

Erodium pelargoniflorum

famille : Geraniaceae

milieu : rochers calcaires

géo : Turquie, Anatolie

Coussin caduc en été de 30 cm en tout sens. Feuillage vert vif, duveteux, cordiforme, odorant. Fleur blanche striée de rose foncé en fin d'hiver et tout le printemps. Plante pouvant se ressemer dans le jardin. Plein soleil, rocaillie, bordure, massif, -15°C. 5 /m2

code tarif E

Erysimum 'Boule Mauve'

famille : Brassicaceae

milieu :

géo : Horticole

Petit arbuste persistant en boule de 50 cm à 1m en tout sens. Abondante floraison violacée de mars à fin mai. Résiste à la sécheresse, plein soleil, -12°C. 2 à 3 /m2

code tarif **D**

Eryngium paniculatum

famille : Apiaceae

milieu : toundra d'altitude

géo : Amérique du Sud, Chili

Rosette de feuilles vert tendre rappelant une agave, persistant. Floraison blanc vert en pompon sur de haute hampe florale atteignant 1 à 1,50m en début d'été. Soleil, -15°C. Massif de vivaces, jardin naturel, rocaille.

code tarif **F**

Eschscholzia californica

famille : Papaveraceae

milieu : prairie

géo : Californie

Pavot de Californie

Vivace de courte vie, 20 à 30 cm de hauteur, floraison orange vif au printemps, sèche pendant l'été au jardin sec et redémarre à l'automne. Peut se ressemer, plein soleil, sol sec, -12°C. 5 à 8/m2

code tarif **D**

Euphorbia acanthothamnos

famille : Euphorbiaceae

milieu : pelouse sèche, rocaille

géo : Grèce, Crète

Coussin épineux très compact de 20 à 50 cm de hauteur et de 50 cm à 1m de diamètre selon la richesse du sol. Floraison jaune vert en avril mai. Le feuillage est vert vernissé. Elle perd son feuillage pendant les longues périodes de sécheresses. Sol caillouteux, soleil, excellente résistance à la sécheresse, rocaille, bord de muret, jardin naturel. -15°C.

code tarif **G**

Euphorbia ceratocarpa

famille : Euphorbiaceae

milieu : friche, bord de route

géo : Sicile

Plante de 1 à 1,50 m en tout sens, beau feuillage vert clair, persistant lorsque les températures ne descendent pas en dessous de -8°C, la plante est caduque au delà de cette température. Les tiges en hiver deviennent rougeâtres. Très longue floraison jaune acide pouvant aller du printemps à l'automne. Plein soleil, très résistante à la sécheresse, -12°C. 1/m2

code tarif **E**

Euphorbia characias ssp.wulfenii

famille : Euphorbiaceae

milieu : garrigue à romarins

géo : centre et est de la Méditerranée

Feuillage gris bleuté, persistant de 80 cm à 1 m en tout sens. Fleur jaune vert au printemps. Idéal pour des situations difficiles, jardin naturel, massif, rocaille. Résistante à la sécheresse, soleil ou mi-ombre, -15°C. 3 /m2

code tarif **D**

Euphorbia characias subsp.characias

famille : Euphorbiaceae

milieu : bois clair, collines

géo : Espagne, (sud)

Diffère par son feuillage vert glauque très duveteux, 80 à 1cm en tout sens, croissance plus lente que la précédente. Fleur jaune vert au printemps. Idéal pour des situations difficiles, jardin naturel, massif, rocaille. Soleil ou mi-ombre, -15°C. 3 /m2

code tarif **E**

Euphorbia cyparissias

famille : Euphorbiaceae

milieu : lieux cultivés et incultes, surtout calcaire

géo : Europe

Euphorbe petit cyprès

Feuilles très fines, vert tendre, caduques. La plante forme un couvre sol en drageonnant, elle peut avoir un large développement en terrain riche. Floraison jaune vert au printemps. Après fructification, les bractées rouges restent longtemps sur la plante. Soleil, rocaille, -15°C. 5 /m2

code tarif **D**

E **Euphorbia dendroides**



famille : **Euphorbiaceae**

milieu : zone rocheuse et inculte, rocaille

géo : pourtour de la méditerranée, Grèce

Plante de 50 à 1,50 m de hauteur au port très architecturé. Feuille oblongue vert clair devenant orangé avant l'été. La plante est caduque en été montrant ces larges tiges dénudées. Floraison jaune acide au début du printemps. Plein soleil, très résistante à la sécheresse, rocaille talus, -8°C.

code tarif **G**

Euphorbia myrsinites

famille : **Euphorbiaceae**

milieu : pente de roche éruptive, pâturage de montagne, forêt de pin, steppe, zone rocailleuse et sableuse, talus, bord des champs

géo : MéditerranéeTurquie

Euphorbe myrsinite

Feuillage rampant gris vert, port étalé en forme de rayons de 20 à 25 cm et plus en sol riche. Fleur globuleuse jaune vert à l'extrémité des tiges en mars avril. Soleil, mi-ombre, -15°C. Rocaille, bord de muret, 5 /m2

code tarif **D**

Euphorbia nicaeensis

famille : **Euphorbiaceae**

milieu : 0 à 1800m d'alt., prairie sèche, garrigue, bord de route, zone caillouteuse, lieux secs et arides

géo : Sud de l'Europe, sud de la France, Espagne, Portugal, Italie, Croatie, Algérie, DalmatieTurquie

Plante de 10 à 20 cm de hauteur en fleur, feuillage coriace, bleuté avec des reflets rougeâtre en hiver. Port tapissant. Floraison jaune au printemps. Rocaille, sol bien drainé, plein soleil, très résistante à la sécheresse, rocaille, bord de muret, -15°C. 5 /m2

code tarif **E**

Euphorbia rigida

famille : **Euphorbiaceae**

milieu : zone rocailleuse

géo : Afrique du Nordouest de la Méditerranée

Tiges dressées atteignant 20 à 30 cm de hauteur, très beau feuillage bleuté prenant une coloration rouge orangé à l'automne avec le froid. Les feuilles sont pointues. Floraison jaune vert ou jaune orangé en février, mars. Rocaille, pente rocheuse, sol sec et bien drainé, soleil, mi-ombre, -15°C. 5 /m2

code tarif **D**

Euphorbia serrata

famille : **Euphorbiaceae**

milieu : friche

géo : ouest de la Méditerranée

Touffe de feuillage fin, au port dressé. Les feuilles gris vert sont étroites et petites. Les tiges sèchent en hiver, elles se développent sur une hauteur de 40 à 60 cm autant de large. Floraison jaune vert au printemps. Plein soleil, très résistante à la sécheresse, -15°C. 3 /m2

code tarif **D**

Euphorbia spinosa

famille : **Euphorbiaceae**

milieu : rocaille calcaire

géo : Maroc, Algérie, Provence, Roussillon

Euphorbe épineuse

Coussin très compact de 15 à 40 cm de hauteur et de 20 cm à 1m de diamètre selon la richesse du sol. Floraison jaune d'avril à mai. Les hampes florales séchées lui donnent un aspect de plante épineuse. Belle coloration rougeâtre en hiver ou pendant les longues périodes de sécheresses. Cette coloration est d'autant plus marquée que le sol est pauvre et rocailleux. Sol caillouteux, soleil, excellente résistance à la sécheresse, rocaille, bord de muret, jardin naturel. -20°C. 3 à 5 /m2

code tarif **E**

Euphorbia veneris

famille : **Euphorbiaceae**

milieu : pente rocheuse de montagne, éboulis, garrigue, forêt de Pinus nigra entre 880m & 1700m d'alt

géo : Chypre

Feuillage elliptique légèrement coriace, feuilles fines et pointues, gris vert avec des reflets rouge orangé. Port étalé aux tiges rampantes de 20 à 35 cm. Fleurs jaune vert aux extrémités des tiges de février à avril. Soleil, -15°C. rocaille, bord de muret, 5 /m2

code tarif **E**

Felicia filifolia

famille : Asteraceae

milieu : de la Namibie au Namaqualand dans le Karoo et la Province du Cap, dans les montagnes rocaillieuses

géo : Afrique du Sud

Plante de 30 à 50 cm de hauteur et de 0,40 à 0,80 de largeur. Feuillage vert clair, persistant, port rigide. Les feuilles sont fines. Floraison mauve très précoce au printemps. Plein soleil, très résistante à la sécheresse, -12 à -15°C. 3 à 5/m2

code tarif **E**

Ferula communis

famille : Apiaceae

milieu : friches à vivaces mésoxérophiles subméditerranéennes, friche sèche et ensoleillées

géo : pourtour méditerranéen

Grande fêrle, fêrle commune Feuilles très découpées vert tendre, persistantes en hiver et caduques en été pour résister à la sécheresse. Grande hampe florale dressée et architecturée. Très larges ombelles de fleurs jaune acide atteignant 2 à 3m de hauteur en avril mai. Elle garde un aspect décoratif même lorsqu'elle sèche en été. Non comestible. Sol bien drainé, soleil, -15°C. massif, jardin naturel

code tarif **D**

Gaillarda aristata 'Bourgogne'

famille : Asteraceae

géo : horticole

Cultivar à fleur pourpre foncé. Même période de floraison que l'espèce type.

code tarif **D**

Gaillarda aristata

famille : Asteraceae

milieu : prairie, colline, bord de route, bord de voie ferré, friche

géo : Amérique du nord

Gaillarda

Rosette de feuillage vert disparaissant en hiver. Forme de large touffe de 50 cm de largeur. Fleur jaune sur des tiges de 20 à 50 cm de hauteur, pétales frangés en été. Très résistante à la sécheresse, plein soleil, -15°C. Massif, prairie naturelle, talus. 3 à 5 /m2

code tarif **D**

Galium fruticosum

famille : Rubiaceae

milieu : Falaises calcaire, pente entre 50 et 1800m d'altitude, rupicole

géo : Crète

Vivace à la base lignifiée formant un coussin. Feuillage vert foncé, feuilles cuneiformes, oblongues. Floraison blanc crème en fin de printemps. Soleil, sol caillouteux. -12°C. Rocaille, talus.

code tarif **E**

Gaura lindheimeri

famille : Onagraceae

milieu : prairie, bois de pins, bord d'étang

géo : USA, de la Louisiane au Texas, Mexique

Rosette de feuillage vert foncé tacheté de pourpre, disparaissant en hiver. Hampe florale de 1 m de hauteur, portant de très nombreuses petites fleurs blanches très aériennes à la fin du printemps, été et automne. Sol très bien drainé sinon la plante a une courte vie. En sol très lourd, la plante a besoin d'un arrosage estival pour fleurir. Soleil, rocaille, massif, -15°C. 5 /m2

code tarif **D**

Geranium sanguineum

famille : Geraniaceae

milieu : marge des forêts, sur substrat sablo-calcaire des dunes, collines sèches et broussaillieuses, caillouteuses, prairies arides, de 0 à 1200m alt

géo : Europe, Turquie, Caucase

Géranium sanguin

Feuillage vert foncé très découpé virant au rouge en forte période sécheresse. La plante est caduque en hiver. Souche de 15 à 30 cm de hauteur s'étale pour former de grands tapis. Fleur rose violacée au printemps. Soleil, mi-ombre ou ombre. Très résistante à la sécheresse, sous bois sec, talus, rocaille. -15°C. 5 à 8 /m2

code tarif **D**

G **Glaucium rubrum**

famille : **Papaveraceae**

syn. : *Glaucium corniculatum*

milieu : champs et côtes secs

géo : Méditerranée, Europe centrale, Asie occidentale

Belle rosette compacte de 5 à 10 cm de hauteur au feuillage gris bleuté. Fleur de pavot rouge orangé, vermillon, sur des hampes florales de 60 à 80 cm de hauteur à la fin de printemps et début d'été. Sol pauvre et drainé pour une bonne longévité, plein soleil, -15°C. 5 /m2

code tarif **E**

Globularia alypum

famille : **Globulariaceae**

milieu : garrigue, rocaille, parois rocheuses sur calcaire et alluvions graveleux et sableux de 100 à 400 m d'alt

géo : Bassin méditerranéen, Grèce, Afrique du Nord, Asie mineure

Séné de Provence

Buisson à la souche ligneuse et aux tiges dressées de 30 à 50 cm en tout sens. Feuilles étroites, coriaces vert foncé. Capitules de fleurs bleues à bleu violacé à la fin de l'hiver, début du printemps. Plein soleil, sol sec et rocailleux indispensable, supporte difficilement les sols lourds et argileux, rocaille, jardin naturel, -15°C.

code tarif **F**

Globularia cordifolia

famille : **Globulariaceae**

milieu : pelouse rocailleuse ou marneuse

géo : Méditerranée

Plante couvre sol aux tiges ligneuses rampantes. Le feuillage compact est vert foncé, persistant. La petite feuille est en forme de cœur, échancrée au sommet. Floraison en capitules bleues sur des tiges d'une dizaine de cm de hauteur. Soleil, sol rocailleux calcaire. -20°C. Couvre sol, rocaille, 8/m2

code tarif **D**

Globularia orientalis

famille : **Globulariaceae**

milieu : Steppe rocailleuse entre 600 et 1200 m d'alt.

géo : Turquie

Feuillage étalé sur le sol, vert persistant, produisant des stolons qui finissent par former un tapis. Feuilles spatulées vert foncé rougissant en hiver. Floraison formée par plusieurs capitules bleu soutenu le long des tiges érigées au printemps. Plein soleil, sol sec, drainant, rocaille, jardin naturel, -15°C. 5 à 6 /m2

code tarif **F**

Globularia trichosantha

famille : **Globulariaceae**

syn. : *Globularia cordifolia* var. *borjæ*

milieu : steppe aride

géo : Asie Mineure, Turquie (province de Bilecik)

Syrie

Rosette de feuillage au sol, vert persistant, produisant des stolons qui finissent par former de grands tapis couvrant sol. Grandes feuilles vert foncé. Floraison en capitules bleu soutenu sur des tiges érigées de 20 cm de hauteur au printemps. Plein soleil, sol sec, drainant, rocaille, jardin naturel, -15°C. 5 à 6 /m2

code tarif **E**

Gypsophila pacifica

famille : **Caryophyllaceae**

milieu : collines boisées, marges des prairies rocailleuses, entre 200 et 300 m d'alt.

géo : Chine, Sibérie

Feuille verte, linéaire, épaisse, caduque en hiver. Abondante et légère floraison en nuage de petites fleurs blanches en juillet, atteignant 1,20 à 1,50 m. Rabattre en hiver. Soleil, massif, jardin naturel, -20°C. 3 à 5 /m2

code tarif **D**

Gypsophila struthium subsp. hispanica

famille : **Caryophyllaceae**

milieu : pente rocailleuse

géo : Espagne, Navarre, Catalogne

Buisson de 30 à 80 cm de hauteur en fleur, feuilles linéaires, épaisses, un peu grasses sur des tiges dressées. Abondante, compacte et légère floraison en nuage de petites fleurs blanches en été. Plein soleil, sol sec et rocailleux, rocaille, jardin naturel, -15°C. 5 à 8 /m2

code tarif **E**

Haplopappus glutinosus

famille : Asteraceae

syn. : *Aster arbutoides*

milieu : Rochers, steppes alpines entre 2000 à 2500m d'alt

géo : Argentine, Chili

Petit coussin étalé aux nombreuses tiges couchées de 5 à 15 cm en tout sens. Feuilles lobées et effilées, vert vif, persistant. Fleurs aux longs pétales jaune vif en fin d'été. Soleil, sole rocaillieux, -12°C. rocaille, jardin de gravier

code tarif **D****Helianthemum 'Fire Dragon'**

famille : Cistaceae

milieu :

géo : Horticole

Coussin au feuillage vert grisé, persistant de 10 à 15 cm de hauteur par 30 cm de large. Fleur orange profond, au printemps. Soleil, mi-ombre, rocaille, massif, -15°C. 5 à 8 /m

code tarif **D****Helichrysum italicum**

famille : Asteraceae

milieu : rocher, pente rocailleuse.

géo : Bassin méditerranéen,

Port compact formant de beau coussin de 50 à 60 cm de largeur, 30 cm de hauteur. Feuillage au parfum de curry, sucré. Feuille argentée très claire, découpée, fine persistante. Ombelles de fleurs jaunes en juin juillet. Plein soleil, sol très bien drainé et sec, Rocaïlle, éboulis, jardin naturel. - 15°C. 3 /m2

code tarif **D****Helichrysum microphyllum**

famille : Asteraceae

milieu : pelouse sèche, falaise à pelouses alticoles entre 980 à 2100 m d'alt

géo : Crète

Coussin étalé au feuillage compact de 20 cm de haut par 70 cm de large. Les feuilles sont petites et très serrées, gris vert, odorantes. La floraison en capitule jaune d'or est compacte sur des tiges de 5 à 10 cm. Soleil, -15°C. sol bien drainé. Rocaïlle, talus, massif bas, bord de muret.

code tarif **E****Helichrysum orientale**

famille : Asteraceae

syn. : *Helychrisum pichleri*

milieu : falaise calcaire jusqu'à 1200m d'altitude, pente rocheuse

géo : pourtour de la méditerranée, Grèce

Coussin de feuillage, large, duveteux, gris très clair presque blanc. Touffe de 40 cm en tout sens, persistant. Ombelle de fleurs jaune vif en fin de printemps. Plein soleil, sol pauvre et caillouteux, sec, rocaïlle, éboulis, jardin naturel. -15°C. 3 à 5 /m2

code tarif **D****Helichrysum splendidum**

famille : Asteraceae

syn. : *Gnaphalium splendidum*

milieu : plateau ouvert, colline rocailleuse

géo : Afrique du Sud

Coussin arbustif de 50 cm à 1m en tout sens. Feuille argentée très claire, duveteuse, persistante. Ombelles de fleurs jaunes en juillet. Plein soleil, sol drainé, rocaïlle, massif, jardin naturel. - 15°C.

code tarif **E****Hesperaloe parviflora**

famille : Agavaceae

syn. : *Hesperaloe yuccaefolia*

milieu : zone désertique

géo : Province de Chihuahua au Mexique, Texas

Rosette de feuilles à l'aspect de yucca mais non piquante. Feuilles de 30 à 40 cm de hauteur, au coloris vert violacé, raides, très longues légèrement courbées et bordées de fils. De la rosette de feuilles se développe une hampe florale dressée de 1,80 m à 2 m. La hampe se couvre de petites fleurs en forme de clochettes roses saumonées sur l'extérieur de la fleur et crème à l'intérieur des pétales. Floraison au printemps s'allongeant une partie de l'été. Sol très bien drainé au soleil, rocaïlle. -15°C. 1 à 3 /m2

code tarif **E**

H **Heuchera maxima**
 famille : Saxifragaceae
 milieu : Canyons et sous bois de chêne vert.
 géo : Ouest des USA, Iles anglo-normandes
 Touffe compacte de feuillage vert intense de 30 à 70 cm en tout sens. Floraison d'épis léger aux fleurs blanc rosé au printemps. Ombre à mi ombre, supporte très bien la sécheresse. -15°C. Massif, bordure, couvre sol.
 code tarif **E**

Hypericum aegypticum

famille : Clusiaceae
 milieu : Rupicole, falaise rocher en bord de mer
 géo : Maroc, Algérie, Lybie, Grèce, Sud de l'Italie, Malte
 Port plus ou moins compact formant un petit buisson arrondi persistant. Les feuilles petites et grasses sont serrées sur la tige. Petite fleur solitaire jaune citron en forme d'étoile au printemps. Plein soleil, sol argilo calcaire bien drainé. -15°C. Massif, talus, rocaille. 5/m2
 code tarif **F**

Hypericum empetrifolium

famille : Clusiaceae
 milieu : pente rocheuse
 géo : Grèce, Crète, Turquie
 Petit buisson aux tiges dressées rougeâtres de 20 à 30 cm en tout sens. Feuilles vertes linéaires, persistantes prenant des coloris rouge orangé avec le froid. Inflorescences dressées au-dessus de la plante. Nombreuses petites fleurs jaune vif en mai juin. Plein soleil, sol sec et drainé, -15°C. Rocaille, talus, massif, jardin naturel. 7/m2
 code tarif **G**

Hypericum olympicum

famille : Clusiaceae
 milieu : rocaille, sol sablonneux
 géo : Grèce, Turquie
 Coussin de 10 à 15 cm de hauteur, 20 à 30 de largeur. Abondantes petites feuilles vertes, persistantes à ras du sol, rougissant au froid. Inflorescences dressées autour de la plante formant une boule jaune en mai juin. Plein soleil, sol sec et drainé, -15°C. Petit couvre sol, rocaille, bordure de massif, jardin de gravier. 7/m2
 code tarif **D**

Hypericum olympicum 'Citrina'

famille : Clusiaceae
 Identique au précédent mais à la floraison jaune citron.
 code tarif **D**

Hyssopus officinalis

famille : Lamiaceae
 milieu : Côteaux arides, rochers
 géo : Pourtour méditerranéen
 Hysope
 Petites feuilles persistantes, vert foncé formant une touffe de 50 cm de hauteur et largeur. Feuillage très aromatique. Floraison en épi bleu en juin, juillet, mellifère. Soleil, sol drainé et sec -15°C. Rocaille, jardin naturel. 5/m2
 code tarif **D**

Iberis semperflorens

famille : Brassicaceae
 syn. : *Iberis cuneata* l. *florida*.
 milieu : Falaise calcaire entre 0 et 1500m d'alt.
 géo : Sud de l'Italie
 Feuillage persistant, vert soutenu, formant un coussin de 30 à 50 cm de hauteur par 60 à 80 cm de largeur. Feuille épaisse et coriace. Fleurs blanches, odorantes, en hiver et au début du printemps, remontant à l'automne. Bordure, - talus, rocaille, soleil, ombre légère, -15°C. 4 à 5/m2
 code tarif **D**

Incarvillea emodii

famille : Bignoniaceae
 milieu : Falaises et rochers
 géo : Pakistan, Afghanistan
 Rosette de feuilles coriaces très découpées, persistante. Feuillage vert rougissant en hiver et en période de sécheresse. Grappe de fleurs roses en trompette portées par de longs pédoncules de 15 à 50 cm. Soleil, -15°C, rocaille, dallage de pierre, bord de muret.
 code tarif **G**

Inula candida

famille : Asteraceae

milieu : pente rocheuse, éboulis

géo : Croatie (Biokovo), Grèce, Balkans

Petite vivace de 20 cm de largeur 15 cm de hauteur. Grandes feuilles persistantes, blanches duveteuses. Floraison en capitules jaunes à la fin du printemps sur des tiges de 20 à 30 de longueur. Plein soleil, rocaille, jardin de gravier, sol caillouteux pour un plus beau feuillage, bordure, -12°C. 5 à 7 /m2

code tarif **E**

Inula montana

famille : Asteraceae

milieu : pelouse sèche, côtes arides entre 0 et 1200m d'alt

géo : Sud de l'Europe

Vivace aux rosettes de feuillage formant peu à peu un tapis d'une dizaine de cm de hauteur. La feuille est obtuse, blanche soyeuse au dessous, légèrement duveteuse sur le dessus, vert grisâtre. Floraison jaune en juin juillet. Soleil, -15°C. Couvre sol, pelouse sèche.

code tarif **D**

Iris aurea

famille : Iridaceae

syn. : *Iris crocea*

milieu : bois, garrigue

géo : Asie Mineure

Plante de 70 cm à 1,20m en fleur, floraison jaune intense en mai juin, feuillage dressé, élégant et fin, fleurs légères. Soleil, -20°C. 5 à 7/m2

code tarif **E**

Iris orientalis cv.gigantea

famille : Iridaceae

milieu :

géo : Asie Mineure

Grand feuillage atteignant de 1 à 1,50 m de hauteur en fleur, floraison violette en mai juin, demande quelques années après la plantation pour fleurir. Soleil, -15°C. 5 /m2

code tarif **E**

Iris subbiflora

famille : Espagne

Portugal

syn. : *Iris biflora Iris lisboniensis*

milieu : pentes rocailleuses et calcaires

géo : Espagne, Portugal

Petit iris de 20 à 40 cm de hauteur. Floraison violet soutenu durant la première partie du printemps. Soleil, sol rocailleux, -15°C. 5 à 8 /m2

code tarif **E**

Iris taochia forme pourpre

famille : Iridaceae

milieu : Erzurum, Nord de Tortum, 1600m, pentes rocailleuses

géo : Turquie,

Petit iris de 15 cm de hauteur. Fleur violet sombre à barbe jaune au printemps. Soleil, sol rocailleux, -15°C. 8 /m2

code tarif **E**

Iris unguicularis

famille : Iridaceae

milieu : pentes rocailleuses, sols pierreux.

géo : Sud de l'Europe, Afrique du Nord

Iris d'Alger

Beau feuillage persistant feuilles allongées au port retombant. Souche vigoureuse d'une hauteur de 20 à 30 cm de hauteur sur 50 à 60 cm de largeur. Floraison bleu violacé de février à mars au milieu du feuillage. Plein soleil, mi-ombre ou ombre. Bon couvre sol à l'ombre sèche, sol bien drainé, -15°C. 3 à 5 /m2

code tarif **E**

Iris unguicularis 'Alba'

famille : Iridaceae

milieu :

géo : Sud de l'Europe, Afrique du Nord

Forme à fleurs blanches du précédent.

code tarif **E**

L **Lathyrus latifolium**

famille : Papilionaceae

milieu :

géo : Sud de l'Europe

Pois vivace

Longues tiges grimpante ou courant sur le sol et les plantes voisines, ailées de 80 cm à 1,50 m, caduque en hiver. La floraison rose vif au printemps est très abondante. Soleil, à mélanger aux lavandes, bord de muret. -20°C. 1 /m2

code tarif **D**

Les lavandes botaniques

Lavandula angustifolia

famille : Lamiaceae

syn. : *L. officinalis* *L. vera*

milieu : côteaux pierreux , pente rocheuse et ensoleillée en basse montagne, 500 à 1500m d'alt., pinède et chênaie claire, garrigue, zone sèche.

géo : sud de la France, Espagne, Corse, Sardaigne, Sicile, Italie, Dalmatie, Algérie, Pourtour méd

Feuillage compact, gris bleuté, délicatement parfumé de 20 cm en tout sens. Fleurs bleu mauve en épis court portées à 10 à 20 cm au dessus du feuillage en juin. Sol sec bien drainé, au soleil pour éviter la pourriture de la plante -20°C. 5 /m2

code tarif **D**

Lavandula angustifolia var.calabriensis

famille : Lamiaceae

milieu : Mont Polino, pente rocheuse

géo : Italie

Feuillage compact, gris vert, parfumé de 20 cm en tout sens. Fleurs bleu très foncé en épis court dépassant la touffe de feuillage de 10 à 20 cm en juin. Sol rocailleux, sec bien drainé, soleil, -20°C. 5 /m2

code tarif **E**

Lavandula latifolia

famille : Lamiaceae

milieu : basse montagne de 50m à 1800m alt., coteaux arides, ensoleillés, pente rocailleuse, pinède clair

géo : Pourtour Méditerranéen, Espagne, Baléares, Italie, Dalmatie, Algérie, Tunisie

Lavande aspic - Beau coussin de 20 cm de hauteur par 30 cm de largeur, feuillage compact gris bleuté, parfum de lavande légèrement camphré. La floraison atteint 50 à 60 cm de hauteur sur des tiges ramifiées. La floraison à la fin du printemps début d'été est bleue plus ou moins intense selon les souches. Plein soleil, en terrain bien drainé. -20°C. 5/m2

code tarif **D**

Lavandula stoechas

famille : Lamiaceae

milieu : maquis

géo : bassin méditerranéen

Tiges dressées, rigides, boisées. Les feuilles sont gris vert très parfumées, et poilues. Buisson pouvant atteindre 50 à 60 cm en tout sens, variable en fonction des conditions de cultures. La floraison est printanière, les inflorescences sont légèrement carrés, la fleur est mauve avec des bractées violettes, dressées. Plein soleil, sol bien drainé, - 12°C à -15°C . 1 à 3 /m

code tarif **D**

Lavandula x aurigerana

famille : Lamiaceae

syn. : *L. leptostachya*

milieu : site ouvert sur roches calcaires entre 650 et 1100m d'alt.

géo : Pyrénée française et espagnole, nord est de l'Espagne

Hybride naturel entre Lavandula pyrenaica x L. latifolia
Coussin de feuillage argenté, délicatement parfumé de 60 à 80 cm de largeur, jusqu'à 1,20m de haut. Fleurs bleu violacée profond en longs épis au dessus du feuillage en juin, juillet. Sol sec bien drainé, au soleil pour éviter la pourriture de la plante -20°C. 3 /m2

code tarif **E**

Lavandula x gingsinii

famille : Lamiaceae

milieu :

géo :

hybride entre L. dentata x L. lanata
Présente les différentes apparences des deux parents
feuilles gris laineux aux bords dentés, longue fleur bleu soutenu. Forme une boule imposante de 0,80cm en tout sens - Plein soleil, massif, rocaille, jardin naturel.

code tarif **E**

Les hybrides de L. angustifolia

Lamiaceae - Horticole

Hauteur moyenne : 20 cm de feuillage, 30 à 40 cm en fleur. Elles forment de petits coussins compacts de feuillage gris vert ou vert. Elles sont appréciable, en raison de leur petite taille, dans les massifs de vivaces, les rocailles. Un sol sec et bien drainé en hiver est indispensable, soleil, -15°C. 5 /m2

Lavandula angustifolia 'Heavenly Blue'

famille : Lamiaceae

milieu :

géo : Horticole

Fleurs bleu violacé en mai.

code tarif **D**

Lavandula angustifolia 'Hitcote blue'

famille : Lamiaceae

milieu :

géo : Horticole

Coussin compact se couvrant de fleurs d'un beau bleu profond. Feuillage gris.

code tarif **D**

Lavandula angustifolia 'Folgate'

famille : Lamiaceae

milieu :

géo : Horticole

Floraison bleu violacé en juin, bouton orangé. Feuillage gris argenté.

code tarif **D**

Lavandula angustifolia 'Matheronne'

famille : Lamiaceae

milieu :

géo :

Feuillage plus large très marqué par une nervure centrale, gris vert. Fleur bleu soutenu.

code tarif **D**

L **Lavandula angustifolia 'Rosea'**

famille : **Lamiaceae**

syn. : *L. 'Londond Pink'* *L. 'Hitcote Pink'*

milieu :

géo : **Horticole**

Floraison rose claire, feuillage gris vert.

code tarif **D**

Lavandula angustifolia 'Twickle purple'

famille : **Lamiaceae**

milieu :

géo : **Horticole**

Floraison de longs épis bleus tirant sur le violet franc.
Feuillage gris vert.

code tarif **D**

Hybride de lavande laineuse

hybride horticole entre : *L. angustifolia* x *L. lanata*.

Hauteur moyenne : 20 cm de feuillage, 30 cm en fleurs. Sol sec bien drainé, soleil, -15°C. 5 à 7/m²

Lavandula x chaytorae 'Richard Gray'

famille : **Lamiaceae**

milieu :

géo : **Horticole**

Plante très compacte, elle hérite du feuillage gris très clair de la *L. lanata*. Floraison bleu violacé soutenu en juin, juillet.

code tarif **D**

Les lavandins

Lavandula x intermedia **Lamiaceae**

A l'origine, hybride naturel de *L. angustifolia* x *L. latifolia*.

Ils sont plantés en grande culture pour l'essence de lavandin à usage industriel, se sont d'excellent couvre-sol à utiliser en masse ou en bordure.

Elle forme de gros coussin de feuillage gris vert, très compact. Plante vigoureuse pouvant atteindre une hauteur moyenne de 50 à 60 cm de feuillage, 80 à 1m en fleur, et une largeur de 0,80 à 1 m. La floraison débute vers la mi-juin et s'étale jusqu'à la fin du mois de juillet.

Ils demandent une exposition ensoleillée et un sol drainé, -20°C. 3 /m²

Lavandula x intermedia 'Alba'

famille : **Lamiaceae**

syn. : *L. x inter. 'Edelweiss'*

milieu :

géo : **Horticole**

Forme de lavandin à fleur blanche

code tarif **D**

Lavandula x intermedia 'Grosso'

famille : **Lamiaceae**

syn. : *L. x inter 'Dilly Dilly'*

milieu :

géo :

Abondante floraison de longs épis coniques bleu violacé, très florifères. Un des hybrides les plus utilisés en grandes cultures.

code tarif **D**

Lavandula x intermedia 'Sumian'

famille : **Lamiaceae**

milieu :

géo :

Floraison bleu mauve, feuillage gris vert au port compact.

code tarif **D**

Lavandula x intermedia 'Dutch'

famille : Lamiaceae

milieu :

géo : Horticole

Cultivar du début 20°S. Feuillage plus gris clair. Floraison bleu mauve clair.

code tarif D

Lavandula x intermedia 'Super'

famille : Lamiaceae

syn. : *L.x inter. 'Arabian Night'*

milieu :

géo : Horticole

Plante au feuillage compact gris vert. Floraison bleu franc en juin, juillet.

code tarif D

Lavandula x intermedia 'Provence'

famille : Lamiaceae

milieu :

géo : Horticole

Feuillage gris vert. Longue floraison de longs épis co-
niques bleu mauve clair, très florifères.

code tarif D

Lavandula x intermedia 'Hidcote Giant'

famille : Lamiaceae

milieu :

géo : Horticole

Port compact au feuillage dense, gris clair. Floraison bleu
violacé très intense.

code tarif D

Leucanthemum pallens

famille : Asteraceae

milieu : pelouse sèche de 0 à 1300m d'alt.

géo : Méditerranée

Leucanthème
Petite vivace compacte de vingt à quarante cm en tout
sens. Feuillage vert, persistant. Fleur de marguerite
blanche au coeur jaune à la fin du printemps. Soleil, mi-
ombre, sol bien drainé. -15°C. Rocaille, couvre-sol.

code tarif D

Limonium insigne

famille : Plumbaginaceae

milieu : falaise côtière, talus sec,

géo : Espagne, Andalousie,

Grosse rosette aux feuilles vert sombre, épaisses et
coriaces. Nuage de petites fleurs rose soutenu sur des
hampes érigées de 0,20 à 1m de hauteur d'avril à juin.
Plein soleil, sol sec, drainé, rocaille, jardin naturel, -
15°C. 5 /m2

code tarif F

Linum perenne

famille : Linaceae

milieu : pelouses sèches, friches

géo : Europe centrale, Europe du Sud, Caucase,
Afrique du Nord

Lin vivace

Feuillage persistant vert sombre, petites feuilles dispo-
sées sur des tiges dressées de 60 à 70 cm de hauteur
. Petites fleurs bleues très lumineuses au printemps. La
floraison peut remonter légèrement à l'automne. Sol sec,
drainé, soleil, - 15°C. 5 à 6 /m2

code tarif D

Lippia nodiflora

famille : Verbanaceae

syn. : *Phyla nodiflora*

milieu : zone sablonneuse, bande côtière

géo : Amérique du Sud, Mexique, Floride

syn. *Phyla nodiflora*

Feuillage vert caduc en hiver. Se développe rapidement
par ses tiges rampantes très vigoureuses. Fleurs globu-
laires de 0,5 cm blanches et violettes de mai à septembre.
Utilisée en remplacement de gazon. Soleil ou mi-ombre,
résiste à la sécheresse. Peut devenir très envahissante, à
éviter en zone humide. -10°C. 5 à 8 /m2

code tarif D

Lithodora zahnii

famille : Boraginaceae

syn. : *Lithospermum zahanii*

milieu : falaise rocheuse

géo : Grèce (sud)

Coussin dense et compact de 30 à 50 cm de hauteur,
persistant. Petite feuille vert foncé, coriace. La floraison
bleu clair virant au mauve. Plein soleil, sol rocailleux et
calcaire. -12°C, Rocaille, bord de muret.

code tarif E



Lithodora hispidula

famille : **Boraginaceae**

milieu : ravin, falaise, zone rocailleuse, de 0 à 1200 m d'alt.

géo : Crète, Karpathos

Cousin dense de 50 cm en tout sens au feuillage vert très soutenu, coriace et velu. Petite fleur bleu vif à bleu violacé au printemps. Soleil, -12°C. Rocaille, bord de muret.

code tarif **E**

Lithospermum purpureocaeruleum

famille : **Boraginaceae**

syn. : *Buglossoides purpureocaerulea*

milieu : bois clairs, lisière forestière, fourrés thermo-philés 100 à 1400 m alt.

géo : Europe, région méditerranéenne

Grémil pourpre bleu

Petite plante de 10 à 20 cm de hauteur aux tiges dressées retombantes au sol où elles s'enracinent, colonisant ainsi l'espace. Feuille lancéolée, pointue, vert sombre et rugueuse. Floraison bleu fanant légèrement pourpre. Mi-ombre, couvre sol en sous bois clair, massif, rocaille, jardin naturel, -20°C. 5 à 8/m2

code tarif **E**

Lutzia cretica

famille : **Brassicaceae**

milieu : endémique rupicole, sur roches et falaises calcaires de 0 à 800 m d'alt.

géo : Crète, Karpathos

Coussin compact de 15 à 30 cm de hauteur par 30 à 40 cm de large. Feuille gris clair avec une nervure centrale bien marquée. Floraison jaune intense au début du printemps. Soleil, sol bien drainé, -12°C. Rocaille, massif, jardin de gravier, couvre sol

code tarif **E**

Malvastrum lateritium

famille : **Malvaceae**

milieu :

géo : Argentine, Uruguay

Feuille vert sombre persistante se développant rapidement grâce à des tiges rampantes vigoureuses, de 5 à 15 cm de hauteur. Fleur de mauve rose abricot de mai à juillet. Excellent couvre sol en climat doux. Soleil ou mi-ombre sèche, -8°C, -10°C. 5 /m2

code tarif **D**

Matricaria tchihatchewii

famille : **Asteraceae**

syn. : *Tripleurospermum tchihatchewii*

milieu :

géo : Asie Mineure

Couvre-sol compact à croissance rapide de 5 à 10 cm de hauteur. Feuillage vert foncé très découpé. Fleurs blanches à cœurs jaunes abondantes en forme de petites marguerites pendant tout le printemps. Peut sécher totalement en été en période de très forte sécheresse et redémarrer avec les premières pluies d'automne. A utiliser en remplacement de gazon, massif, soleil, mi ombre, -15°C.

code tarif **M**

Micromeria fruticosa ssp fruticosa

famille : **Lamiaceae**

Clinopodium serpyllifolium ssp. fruticosum

milieu : steppe, rocaille, colline rocailleuse, ruine

géo : Liban, Turquie, Syrie, Palestine

Micromérie blanc - Petit buisson dressé de 20 à 60 cm en fleur, persistant. Feuillage gris vert tomenteux dégageant une forte odeur de menthe lorsqu'il est froissé. Petite fleur blanc rosé en au printemps et à l'automne. Soleil, rocaille, jardin de gravier, aromatique, -12°C

code tarif **E**

Michauxia campanuloides

famille : **Campanulaceae**

milieu : rocaille, zone rocheuse

géo : Turquie, Syrie, Israël

Rosette de feuillage vert foncé en forme de lyre. Grande hampes florales ramifiées portant des fleurs aux longs pétales recourbés, les étamines dirigés vers le bas. Floraison de mai à juillet, bisannuelle pouvant se ressemer. Soleil, rocaille, prairie naturelle. -15°C.

code tarif **F**

Minuartia pestalozzae

famille : **Caryophyllaceae**

syn. : *Alsine pestalozzae*

milieu : Rupicole, crevasse rocailleuse et falaises, entre 1600 et 2200 m d'alt.

géo : Sud Ouest de la Turquie

Coussin à la forme presque parfaite, très compact. Les feuilles pointues sont presque épineuses. Petite fleur étoilée blanc vert, porté par un pédoncule d'une quinzaine de centimètre. Soleil, -20°C. Rocaille, bord de muret.

code tarif **E**



Mirabilis multiflora

famille : **Nyctaginaceae**

milieu : terrains ouverts et rocailleux des zones désertiques

géo : USA, Arizona nouveau Mexique

Plante aux tiges rampantes de 30 à 40 cm, feuillage décoratif vert bleuté. Fleurs rose violacé de 2 cm de diamètre environ au printemps et en été. Rocaille, talus bien drainée, sol pauvre et caillouteux pour une bonne floraison. Plein soleil, - 12°C. 3 à 5/m2

code tarif **F**

Morina persica

famille : **Morinaceae**

milieu : Prairie sèche entre 900 et 2100m d'alt.

géo : Grèce, Turquie, Liban

Grande rosette de feuilles épineuses de 20 à 30 cm de diamètre. Floraison blanche et rose, très parfumée, sur de grandes tiges épineuses de 0,80 1,20m de hauteur en juin début juillet. Plein soleil. Sol très bien drainé, rocaille sèche. - 20°C

Disponible en quantité limité

code tarif **G**

Nepeta amethystinum

famille : **Lamiaceae**

syn. : *Nepeta nepetella subsp. amethystina*

milieu : matorral, zone inculte et rocailleuse, bord de chemin entre 50 et 1400m

géo : Espagne (centre et est)

Petit coussin de 10 à 20 cm en tout sens, aux feuilles en forme de triangle, dentées, gris vert, duveteuses, caduques au-delà de -7°C. Fleur mauve à la lèvre mouchetée de bleu soutenu, au printemps. Plein soleil, sol caillouteux, rocaille, jardin naturel, -15°C. 8/m2

code tarif **E**

Nepeta curviflora

famille : **Lamiaceae**

milieu : Phrygana

géo : Israël, Liban, Syrie

Grand nepeta de 30 cm à 80 cm de hauteur. Les feuilles sont opposées, dentées, de couleur gris vert, assez clair, caduque en hiver, aromatique. Les hampes florales s'élèvent au dessus du feuillage, formant une boule de fleur bleu violacé soutenu au printemps. Plante de plein soleil, jardin naturel, massif, rocaille, bord de muret. - 12°C.

code tarif **E**

Nepeta phyllochlamys

famille : **Lamiaceae**

milieu : Pente rocheuse, zone rocailleuse dans les bois, de 60 à 2900 m d'alt.

géo : Turquie

Coussinet de 15 à 20 cm en tout sens, aux feuilles cordiformes, gris très clair, duveteuses, caduques. Fleur rose à la lèvre mouchetée de rose soutenu ou bleu, au printemps. Plein soleil, sol caillouteux, massif, rocaille, jardin naturel, jardin de gravier. -15°C. 8/m2

code tarif **F**

Oenothera macrocarpa ssp. macrocarpum

famille : **Onagraceae**

syn. : *Oenothera missouriensis*

milieu : Affleurement calcaire

géo : Centre des USA

Onagre du Missouri

Longues feuilles vert mat caduques en hiver. Son port compact atteint 10 à 15 cm de hauteur et 20 à 30 cm de largeur. De grosses fleurs jaune franc se succèdent tout l'été. Soleil, rocaille (sol pas trop pauvre), massif de vivace, -15°C. 5 à 6/m2

code tarif **D**

0 **Oenothera odorata**

famille : **Onagraceae**

syn. : *Oenothera sulphurea odorata* *Oenothera stricta*

milieu :

géo : Amérique du sud/Chili

Rosette de feuillage vert foncé avec une nervure centrale blanchâtre. Longues tiges rougeâtres érigées au bout desquelles s'épanouissent de grandes fleurs jaune citron virant à l'orangé lorsqu'elles fanent. Les fleurs dégagent un léger parfum et s'ouvrent le soir pour faner le matin, elles se succèdent tout l'été. Plein soleil, massif de vivaces, jardin naturel, -15°C. 6 /m2

code tarif **D**

Onosma alboroseum

famille : **Boraginaceae**

milieu : pente rocailleuse calcaire entre 1800 et 2800m d'alt.

géo : Turquie, Syrie, Irak

Plante formant un joli tapis compact et robuste de 10 cm de hauteur x 0,80 à 1 m de diamètre. Le feuillage est gris bleuté, rugueux très décoratif toute l'année. La floraison rose et blanche en grappe vire au bleu en vieillissant en mai juin. Plein soleil, sol très bien drainé, rocaille, talus -15°C. 3 à 5 /m2

code tarif **E**

Onosma sorgerae ssp.sorgerae

famille : **Boraginaceae**

milieu : steppes, zones rocheuses et rocailleuses

géo : Italie, Balkan, Lybie, Liban, Maroc, Turquie

Feuillage vert foncé, rugueux au point d'être légèrement épineux, formant un petit coussinet de feuillage de 5 à 10 cm de hauteur, 20cm de largeur. La floraison jaune en grappe se dresse sur des tiges de 20cm de hauteur au printemps. Plein soleil, très résistant à la sécheresse, -15°C.

code tarif **E**

Origanum dictamnus

famille : **Lamiaceae**

milieu : falaise, gorges, rocaille

géo : Crète

Petit origan caduc, de 5 à 30 cm aux tiges souples. Les feuilles gris vert, rondes, sont très duveteuses, presque laineuses. Floraison blanc rosé entourée de bractées rose soutenu en fin de printemps, été. Soleil, rocaille, -12°C.

code tarif **F**

Origanum 'Kent Beauty'

famille : **Lamiaceae**

milieu :

géo : Horticole

hybride de *O.rotundifolium* x *O.scabrum*

Tapis de feuillage vert tendre de 5 à 7 cm de hauteur s'étendant par ses racines souterraines pour former un couvre-sol de 50 cm de large, feuillage caduc. Superbe floraison violacée à grosses bractées roses sur des tiges atteignant 20cm de haut, au printemps. Plein soleil, sol bien drainé, rocaille, pot, -15°C. 5 /m2

code tarif **D**

Origanum laevigatum 'Herrenhausen'

famille : **Lamiaceae**

milieu :

géo : Horticole

Feuillage compact formant un tapis de 5 cm de hauteur de couleur vert pourpré, caduc en hiver. Fleur rose pourprée en juillet août sur des hampes florales de 20 à 40 cm de hauteur. Plein soleil, très adaptable sur la nature des sols, rocaille, jardin naturel, -15°C. 5 /m2

code tarif **D**

Origanum majorana

famille : **Lamiaceae**

syn. : *O.dubium*

milieu :

géo : Sud de l'Europe

Plante compacte de 20 cm dans tous les sens, feuillage persistant vert olive, très aromatique, utilisé en cuisine. Floraison blanche au début de l'été. Plein soleil, rocaille, massif de vivaces, plantes aromatiques, -12°C. 5 /m2

code tarif **D**

Origanum maru

famille : **Lamiaceae**

syn. : *O.syriacum var bevanii*

milieu : pente rocheuse monts Amanus

géo : Chypre, Liban, Turquie

Origan au port érigé et buissonnant de 50 à 90 cm en tout sens. Base des tiges boisée, petites feuilles gris vert, duveteuses très aromatiques. Floraison blanche en juin début juillet. Plein soleil, grande rocaille, massif, jardin naturel, -15°C. 3 à 5 /m2

code tarif **E**

Origanum onites

famille : **Lamiaceae**

milieu : garrigue, les collines sèches sur les sols rocaill-leux.

géo : Balkans, Grèce, Turquie

Buisson au port naturellement arrondi de 0,50 à 0,80 m en tout sens, à la base des tiges boisées. Les feuilles persistantes sont vertes, très aromatiques. Fleurs blanches en juin début juillet. Plein soleil, plante imposante à associer dans les massifs, jardin naturel, talus. -15°C. 3 /m2

code tarif **D**

Origanum syriacum

famille : **Lamiaceae**

syn. : *Majorana syriaca*

milieu : collines, murs, rocailles

géo : Liban, Syrie

Feuilles gris vert, duveteuses, très aromatiques. Les tiges sont raides et boisées de 50 à 60 cm de hauteur. La floraison blanche s'épanouie en juin, juillet. Plein soleil, massif, jardin naturel, jardin de plantes aromatiques -15°C. 3 à 5 /m2

code tarif **E**

Pelargonium endlicherianum

famille : **Geraniaceae**

milieu : éboulis entre 650 et 1500 m d'alt.

géo : Turquie

Un des rares pélargonium résistant au froid. Ses feuilles sont petites, arrondies, épaisses, vertes. Le feuillage persistant ne dépasse pas les 5 à 10 cm de hauteur et de largeur. Une racine charnue est visible de la surface du sol. La floraison rose vif a lieu en été; légère et gracieuse elle s'épanouie sur de longues tiges de 15 à 20 cm de hauteur. Plein soleil ou mi-ombre en terrain très très bien drainé, en pot. -15°C. 8 /m2

code tarif **F**

Petromarula pinnata

famille : **Campanulaceae**

milieu : falaise, fissures de roche, ruine

géo : Grèce, Crète

Vivace formant une rosette de feuilles. Celles-ci sont grandes, découpées vert tendre disparaissant en hiver. Fleurs bleu clair portées sur des tiges de 20 à 50 cm au-dessus du feuillage au printemps. Soleil, sol rocaill-leux, jardin naturel, rocaille, -15°C. 5 à 8/m2

code tarif **F**

Phlomis anisodonta f. alba

famille : **Lamiaceae**

milieu : Pelouses sèches subalpines entre 2950 et 3210m d'alt.

géo : Iran, Iraq,

Phlomis herbacé au feuillage à ras du sol ne dépassant les 10 cm de hauteur. Les feuilles sont allongées, vertes, duveteuses. caduques en hiver. Au printemps, de nombreuses fleurs blanches se développent au-dessus du feuillage sur des tiges de 20 à 30 cm de hauteur. Plein soleil, couvre sol à associer aux vivaces, jardin naturel, -15°C. 3 à 5 /m2

code tarif **E**

Phlomis capitata

famille : **Lamiaceae**

milieu : Steppe, forêt de chênes, rocaille

géo : Turquie

Plante couvre sol se développant en large tapis de 5 cm de hauteur grâce à ses racines souterraines. Les feuilles sont persistantes mais se rétractent en hiver. Elles sont vert olive à reflets jaunes. La floraison jaune d'or en avril mai se dresse sur des tiges d'une vingtaine de cm au dessus du feuillage. Soleil,mi-ombre, massif, couvre-sol, -15°C ; 5 /m2

code tarif **E**

P **Phlomis herba-venti**

famille : **Lamiaceae**

milieu : Lieux secs et incultes

géo : Europe du sud, Afrique du nord, Asie Mineure

Large rosette de feuilles vertes, caduques en été et en hiver. La plante démarre sa végétation au printemps. Elle développe des inflorescences d'une hauteur de 30 à 50 cm, portant des fleurs rose violacé à la fin du printemps. La floraison abondante forme une boule de fleurs roses très impressionnante. Plein soleil, sol sec, condition aride, jardin naturel, -15°C. 5 /m2

code tarif **D**

Phlomis lychnitis

famille : **Lamiaceae**

milieu : Bords de chemin, pentes rocheuses,

géo : Turquie, France, Espagne

Plante de 50 cm de large, aux fines feuilles, gris vert, duveteuses, persistantes. Fleurs jaunes surmontant de 30 à 40 cm le feuillage de mai à début juillet. Soleil, massif, talus, jardin naturel, -12°C. 5 /m2

code tarif **E**

Phlomis nissolii

famille : **Lamiaceae**

milieu : Causses et steppes calcaires

géo : Turquie, Liban, Syrie

Rosette de feuilles cotonneuses et charnues, gris jaune très clair presque blanches à la saison sèche. Floraison jaune clair au mois de juin juillet, se développant au-dessus de la rosette de feuillage sur de longues tiges de 1 à 1,50 m. Soleil, sol rocailleux, jardin naturel, massif, -15°C. 5 à 8 m/2

code tarif **E**

Phlomis russeliana

famille : **Lamiaceae**

milieu : Clairières, bois,

géo : Turquie

Puissant couvre sol aux larges feuilles duveteuses, vert mat. Le feuillage persistant ne dépasse pas les 15 à 20 cm de hauteur. Les fleurs jaune citron surmontent de 80 cm à 1 m le feuillage de mai à début juillet. Les fleurs séchées restent esthétique très longtemps. Soleil ou mi ombre, massif, talus, jardin naturel, -15°C. 5 /m2

code tarif **D**

Phlomis samia

famille : **Lamiaceae**

milieu : Lisière de bois de pins et de cèdres, sur roche métamorphique.

géo : Grèce , Asie Mineure

Couvre sol s'étalant grâce à ses racines souterraines. Feuilles vertes, duveteuses, larges. Floraison rose chair à la fin du printemps et début de l'été, portée par de hautes hampes de 1 à 1,60 m. Très beau graphisme des hampes florales même lorsqu'elles sont sèches. Soleil ou mi-ombre, -20°C. 5 /m2

code tarif **E**

Phlomis tuberosa

famille : **Lamiaceae**

milieu : Steppe de 1400 à 2300 m d'alt.

géo : Sud de l'Europe, Turquie, Asie Centrale

Rosette de feuilles de 20 cm de diamètre, vert tendre au ras du sol. La plante est caduque en hiver et en été lors des périodes de sécheresses; en zone fraîche elle garde son feuillage. Les fleurs s'épanouissent sur des hampes florales d'environ 1m. Floraison rose foncé au printemps. Plein soleil, massif de vivaces, prairie naturelle, -15°C. 8 /m2

code tarif **D**

Polygonum equisetiforme

famille : **Polygonaceae**

milieu : semi-steppe, steppe d'arbustes,

géo : Afrique du Nord, Iran, Turquie, Israël, Sardaigne

Plante dressée de 50 cm à 1 m de hauteur par 30 à 50 cm de largeur. Les tiges ressemblent à celles de la prêle. Minuscules et peu abondantes, les feuilles sont alternes et entières, vert sombre. Floraison de petites fleurs blanches, légèrement parfumées de juin à septembre, remontant tout au long de l'année si le climat reste doux. Soleil, mi-ombre, sol caillouteux, rocaille, jardin naturel, -15°C. 3 à 5 /m2

code tarif **E**

Potentilla neumanniana

famille : Rosaceae

syn. : *Potentilla verna*

milieu : pelouse sèche, bord de chemin

géo : Europe

Couvre sol très compact au feuillage persistant de 2 à 5 cm de hauteur. Les feuilles sont dentées et velues, vert foncé. Plante très puissante pouvant être piétinée. Fleurs jaune vif en mars et avril. Soleil mi-ombre, pelouse sèche, rocaille, jardin naturel, -20°C. 6 à 8/m2

code tarif D

Ptilostemon chamaepeuce

famille : Asteraceae

syn. : *Serratula chamaepeuce* *Cirsium chamaepeuce*

milieu : falaise et escarpement calcaire 0 à 850m d'alt

géo : Grèce, Crête, Chypre, Liban, Turquie (Anatolie)

Feuille linéaire gris vert, au revers blanc duveteux, formant un coussin dense de 30 cm à 1m en tout sens. Les tiges sont laineuses, blanches. Floraison en capitule rose vif sur de longues tiges florales rappelant une fleur de centauree au printemps. Soleil, sol caillouteux, rocaille, jardin naturel, -15°C. 1 à 3 /m2

code tarif E

Putoria calabrica

famille : Rubiaceae

milieu : sol rocailleux en dessous de 2000m alt. bois, garrigue, roche calcaire

géo : Afrique du Nord/Sud de l'Espagne, Turquie, Iran, Israël

Arbrisseau rameux à port prostré de 5 à 10 cm de hauteur formant un coussin de 50 cm à 1m de diamètre. Feuillage lisse, vert foncé, persistant. Petites fleurs tubulaires rose vif de mai à novembre suivies de fruits rouge sombre. Soleil, sol caillouteux et drainant, rocaille, -15°C. 5 /m2

code tarif F

Rhodanthemum catananche

famille : Asteraceae

milieu : Haut atlas jusqu'à 2500m d'alt. Pentas, rocheuses, éboulis

géo : Maroc

Coussin compact de 10 à 15 cm de hauteur en fleur x 20 cm de largeur au feuillage finement découpé vert foncé. Nombreuses fleurs en forme de marguerite au printemps. Les pétales blanc crème ont la base pourpre et le cœur jaune. Plein soleil, sol très caillouteux, rocaille, éboulis, bord de muret, -15°C. 5 à 8 /m2

code tarif E

Rhodanthemum catananche 'Tizi-n-Tichka'

famille : Asteraceae

milieu : montagne de l'Atlas

géo : Maroc

Même type de feuillage que le précédent mais à plus petit développement, 10 cm de diamètre et 5 cm de hauteur. Fleur de marguerite blanche à cœur jaune au printemps. Plein soleil en sol bien drainé, -15°C. 8 /m2

code tarif F

Rhodanthemum gayanum

famille : Asteraceae

syn. : *Pyrethrum gayanum*

milieu : forêts et pâturages rocailleux, basses et moyennes montagnes

géo : Afrique du Nord

Petit coussin d'une quinzaine de cm de hauteur, 20 à 30 cm de largeur. Feuillage découpé vert foncé, persistant. Fleur de marguerite rose au printemps. Soleil, sol bien drainé. -15°C. Rocaille, jardin de gravier, haut de muret.

code tarif E

Rhodanthemum hosmariense

famille : Asteraceae

syn. : *Chrysanthemum hosmariense*

milieu : Montagne de l'Atlas, pentes entre 1200 et 1550m d'alt.

géo : Maroc

Marguerite marocaine
Petit coussin compact d'une vingtaine de cm de hauteur. Feuillage découpé gris argenté, persistant. Fleur de marguerite blanche au cœur jaune au printemps. Soleil, sol bien drainé. -15°C. Rocaille, jardin de gravier, haut de muret.

code tarif E

R
<
S

Romneya coulteri

famille : Papaveraceae

milieu : Ravin aride , pente rocheuse très ensoleillée, surface lessivée

géo : Californie, sud est de L.A

Pavot en arbre

Beau feuillage bleuté, coriace, semi- persistant, atteignant 1 à 1,50m de hauteur. La plante s'étale grâce à ses racines souterraines. Grandes fleurs blanches aux pétales froissés dégageant un parfum suave. Plus adaptée aux petits jardins car moins envahissant que la variété trichocalyx. Soleil ou mi-ombre, sol bien drainé, - 15°C. 3 /m

code tarif F

Romneya coulteri var.trichocalyx

famille : Papaveraceae

milieu : Chaparral

géo : Californie

Pavot en arbre -

Plante de 1 à 2 m de hauteur, s'étalant de manière importante grâce à ses racines souterraines. Magnifique feuillage bleuté semi-persistant, moins coriace que le coulteri. Fleur blanche à cœur jaune et aux pétales froissés d'une quinzaine cm de diamètre à la fin du printemps, dégageant un parfum acidulé. Sol très bien drainé, sec, soleil ou mi-ombre, à réserver aux grands jardins, - 15°C. 1 / m2

code tarif F

Rumex induratus

famille : Chenopodiaceae

milieu : pied de mur, flanc, pente sèche, terrain rocailleux entre 0 & 1000m alt.

géo : Espagne, Afrique du Nord

Couvre sol de 30 à 50 cm de haut, au feuillage sagitté, gris bleuté, disparaissant en hiver en climat froid. Inflorescence ramifiée aux fleurs roses, vertes ou crèmes au printemps et début d'été. Bel effet lorsqu'elle est plantée en masse. Soleil ou mi-ombre, sol bien drainé, couvre sol, massif, talus, jardin naturel, - 15°C. 3 /m2

code tarif D

Ruta chalapensis

famille : Rutaceae

syn. : *R.chalapensis subsp. bracteosa*

milieu : friches

géo : Pourtour méditerranéen

Rue de Chalep

Petit arbuste persistant aux feuilles vert glauque à foliole ovale de 40 à 80 cm de hauteur. Plante très odorante lorsqu'on la froisse. Fleur jaune aux pétales légèrement frangés d'avril à juillet. Soleil, jardin naturel, massif, -15°C, 5 /m

code tarif D

Salvia aethiopis

famille : Lamiaceae

milieu : prairie sèche, côteaux, friches, pâtures secs .

géo : Bassin Méditerranéen

Sauge d'Ethiopie – Large rosette de feuilles vert blanchâtre, très duveteuses. Floraison en mai juin de grande hampe florale pyramidale au multiples tiges. Fleur blanche aux calices recouvert de laine blanche. La plante a un comportement bisannuelle. Soleil, jardin naturel, jardin de gravier, jardin de graminée. -20°C.

code tarif D

Salvia apiana

famille : Lamiaceae

milieu : Chaparral

géo : Sud de la Californie

Plante de 40 cm de diamètre, feuilles lancéolées, lisses, gris blanc, particulièrement aromatique. Hautes inflorescences en panicules ramifiées de fleurs blanches aux boutons jaunes pouvant atteindre 1 à 1,20 m de haut. Sol très sec bien drainé été comme hiver. Rocaille, massif, éboulis -10°C à -12°C. 5 /m2

code tarif F

**Salvia azurea**famille : **Lamiaceae**

milieu : prairie, pâturage

géo : Amérique du nord

Plante disparaissant totalement en hiver. Ses feuilles vert foncé sont petites, linéaires, luisantes. Grappes de fleurs bleu clair en automne aux extrémités de longues tiges. Ces tiges ont un port très souple d'1m à 1,20 m de hauteur. En sol riche elles se couche, en sol très très pauvre elles restent droite. Plein soleil, massif de vivaces, rocaille - 12°C. 3 à 5 /m2

code tarif **D****Salvia canescens**famille : **Lamiaceae**syn. : *S.canescens* var.*daghestanica*

milieu : pentes rocailleuses calcaires

géo : Russie, Caucase

Coussin compact de 15 à 30 cm en fleur, 30 cm de largeur. Le feuillage gris clair duveteux presque blanc. Floraison bleu violacé au printemps. Soleil, sol bien drainé, rocaille, jardin de gravier. -15°C.

code tarif **E****Salvia chamaedryoides** var.**isochroma**famille : **Lamiaceae**syn. : *S. 'Silver leaves'*

milieu : colline aride

géo : Mexique

Forme arbustive de 40 cm de hauteur x 80 cm de largeur. Feuillage gris. Floraison bleu soutenu au printemps et à l'automne, mais peut refleurir tout l'été en cas d'arrosage. Plein soleil, sol bien drainé, massif, rocaille, -15°C. 1 à 3 /m2

code tarif **E****Salvia clevelandii**famille : **Lamiaceae**

milieu : Chaparral, broussaille côtière - 0 à 900m d'alt

géo : Californie

Buisson compact de 0,70 à 1m en tout sens. Feuillage gris vert, particulièrement parfumé, persistant. Fleur bleu franc, pédoncule violet foncé, disposé en couronne le long de la tige florale à la fin du printemps. Soleil, massif, talus, rocaille. -12°C.

code tarif **F****Salvia chrysophila**famille : **Lamiaceae**

milieu : pente calcaire, prairie d'altitude

géo : Turquie

Rosette de feuillage vert, tomenteux, de 20 à 40 cm de large disparaissant en hiver. Nombreuses hampes florales ramifiées de 60 cm de hauteur portant des épis de fleurs bleu mauve clair au printemps. Plein soleil, massif, jardin naturel, rocaille. -15°C.

code tarif **F****Salvia cyanescens**famille : **Lamiaceae**

milieu : colline caillouteuse, friche, talus argileux,

géo : Turquie, Iran

Rosette de feuillage duveteux gris vert, persistant. Hampe florale horizontale de 50 cm de longueur couverte de fleurs bleu clair au printemps. Plein soleil, massif, rocaille, -15°C. 5 /m2

code tarif **E****Salvia deserta**famille : **Lamiaceae**

milieu : prairie, lisière de forêt

géo : Caucase

Rosette de feuilles vertes gaufrées, persistante. Fleurs bleu clair très lumineuses en début d'été sur des tiges ramifiées de 80 cm de hauteur. Plein soleil, se ressème, jardin naturel, massifs de vivaces -15°C. 8 /m2

code tarif **D****Salvia greggii**famille : **Lamiaceae**

milieu : pente rocailleuse,

géo : Sud des USA, Mexique

Feuillage persistant de 30 à 50 cm de diamètre, très fines feuilles vert foncé, luisantes, collantes et fortement parfumées. Fleurs rouge foncé sur des tiges pourprées de mai à octobre. Plein soleil, massif, jardin naturel, -15°C. 3 /m2

code tarif **D**

S **Salvia greggii 'Alba'** 

famille : **Lamiaceae**
milieu :
géo :
Identique à la *Salvia greggii* type mais à fleur blanche

code tarif **D**

Salvia greggii 'Peach' 

famille : **Lamiaceae**
milieu :
géo :
Identique à la *Salvia greggii* type mais à fleur orangé

code tarif **D**

Salvia indica

famille : **Lamiaceae**
milieu : pente rocailleuse
géo : Turquie, Iran, Palestine
Rosette de feuillage d'une vingtaine de cm de large atteignant une hauteur de 40 à 60 cm en fleur. Feuilles gris vert, poilues, parfumées. Floraison gris bleu au printemps sur des tiges dressées. Soleil ou mi-ombre, massif de vivaces, -12°C 6 /m2

code tarif **E**

Salvia interrupta

famille : **Lamiaceae**
milieu : pente rocheuse de l'Atlas
géo : Maroc
Rosettes de feuilles ramifiées vertes, rugueuses, persistantes. Nombreuses hampes florales de 80 cm de hauteur portant des épis de fleurs bleu soutenu au printemps et à l'automne. Plein soleil, massif, jardin naturel, -15°C. 3 /m2

code tarif **D**

Salvia judaïca

famille : **Lamiaceae**
milieu : pente rocailleuse, bord de route
géo : Israël, Liban
Rosette de feuilles dentées, vert foncé. Hampes florales aux tiges rouges de 50 cm de hauteur, ramifiées pourtant des fleurs mauves et un calice pourpre. Les bractées plus foncées contrastent avec les fleurs. Soleil, mi-ombre, massif, rocaille, -15°C.

code tarif **E**

Salvia lavandulifolia

famille : **Lamiaceae**
milieu : garrigue
géo : Sud de la France, Espagne
Feuilles grises, fines, étroites, persistantes et aromatiques. Touffe de 20 à 30 cm de hauteur x 80 cm de largeur. Floraison bleu foncé au printemps. Bon couvre sol. Plein soleil, sol drainé et sec, massif, rocaille, jardin naturel, - 20°C. 2 /m2

code tarif **D**

Salvia lavandulifolia subsp.vellerea

famille : **Lamiaceae**
milieu : matorral
géo : Espagne, Sud de la France
Buisson dressé, au port rigide. Les tiges sont boisées, les feuilles larges, grises presque blanches, persistantes et très aromatiques. Floraison bleu foncé sur de courts pédoncules au printemps. Soleil, rocaille, massif, -12°C. 1/m2

code tarif **E**

Salvia lavandulifolia 'Brac'

famille : **Lamiaceae**
milieu : garrigue, fourrés
géo : Balkans
Proche de la *Salvia lavandulifolia* type mais avec un feuillage beaucoup plus clair, presque blanc et une feuille plus allongée. La floraison est bleu violacée au printemps. -15°C. Soleil mi-ombre. Massif, rocaille, talus, couvre sol, jardin d'aromatique.

code tarif **E**

Salvia munzii 

famille : **Lamiaceae**
milieu : Chaparral de basse altitude
géo : Californie
Buisson dressé de 0,70 à 1m. Feuillage gris vert, odorant, persistant. Fleur bleu clair disposé en couronne le long de la tige florale à la fin du printemps. Soleil, massif, talus, haie basse. -12°C.

code tarif **F**

Salvia nemorosa

famille : Lamiaceae

milieu : steppes, pentes rocheuses

géo : centre et est de l'Europe, Turquie

Rosette de feuillage vert, caduc. Génèreuse floraison d'épis bleu violacé foncé en juin juillet sur des tiges d'une hauteur de 1 à 1,20 m. Plein soleil, très intéressant dans les massifs de vivaces, sol drainé, -20°C. 5 /m2

code tarif D



Salvia phlomoides

famille : Lamiaceae

milieu : prairie de montagne, butte, matorral sec de 600 à 1400m d'altitude

géo : Espagne

Coussinet bas et compact de 20 à 60 cm en fleur, 30 cm de largeur. Le feuillage est gris vert clair, duveteux. Floraison bleu violacé au printemps. Soleil, sol bien drainé, rocaille, jardin de gravier, bord de muret. -12°C.

code tarif F

Salvia pomifera

famille : Lamiaceae

milieu : versant rocailleux, falaise calcaire

géo : Grèce, Crète, Turquie

Buisson persistant de 70 à 80 cm de hauteur et largeur, aux feuilles gris bleuté, aux bords sinueux et très aromatiques. Fleur bleu clair au calice vert et violacé. Plein soleil, sol sec bien drainé, rocaille, massif. -15°C. 3 /m2

code tarif E

Salvia potentillifolia

famille : Lamiaceae

milieu : pente rocheuse sèche, maquis, bois de Pinus

brutia ouvert entre 900 et 1700m alt

géo : Turquie

Coussin étalé de 15 à 20 cm de hauteur, 80 cm à 1 m de largeur, au feuillage gris vert légèrement duveteux. Floraison mauve à la fin du printemps. Soleil, mi-ombre légère, sol bien drainé, rocaille, massif. -15°C. 5/m2

code tarif F

Salvia recognita

famille : Lamiaceae

milieu : pente calcaire, roches éruptives et éboulis dans la steppe, Nevsehir, Wde Urgup, 1200m

géo : Turquie, Nord de la Syrie

Coussin de feuillage gris vert, foncé, persistant, formant un large tapis de 80 cm de diamètre. Longues inflorescences d'1 mètre de hauteur, rose tendre à la fin de printemps. Plein soleil, massif de vivaces, talus, -15°C. 1 /m2

code tarif E

Salvia sclarea 'Alba'

famille : Lamiaceae

milieu : bords de routes, espaces ouverts, cultures

géo : Sud-est de l'Europe, Asie Mineure

Rosette de larges feuilles poilues et aromatiques. Grandes et généreuses inflorescences de 1 à 1,25 m portant des fleurs blanc pur. Vivace se ressemant facilement au jardin. Plein soleil, sol sec bien drainé, -20°C. 3 à 5 /m2

code tarif D

Salvia sonomensis

famille : Lamiaceae

milieu : Pentes arides, zones boisées en dessous de 2000m d'alt.

géo : Ouest USA

Feuillage de 5 cm de hauteur, gris vert, persistant, odorant. De longues tiges s'étalent sur le sol formant un large couvre sol pouvant atteindre 2m de diamètre. Floraison bleu lavande montant jusqu'à 20 cm au printemps. Plein soleil, -15°C. 1 /m2

code tarif E

Salvia spathacea

famille : Lamiaceae

milieu : Chaparral

géo : Californie

Rosette de feuilles rugueuses, poilues, vert soutenu, collantes très odorantes, persistantes. Se développe par drageons. Fleur rouge entourée de grandes bractées pourpre au printemps et en fin d'été. Hautes inflorescences dépassant du feuillage de 90 cm. Sol sec, bien drainé, rocaille, massif, bordure, -15°. 5/m2

code tarif E

S **Salvia spathacea 'Abricot'**



famille : Lamiaceae

milieu :

géo :

Fleur plus orangé que l'espèce type.

code tarif **E**

Salvia viscosa

famille : Lamiaceae

milieu : montagne

géo : Liban, Syrie, Israël

Rosette de feuilles rugueuses, pubescente, vert glauque, persistante. Inflorescence d'épis poisseux aux fleurs rose foncé, atteignant 80 cm de hauteur. Soleil, sol bien drainé, jardin naturel, massif de vivace, - 15°C. 5/m2

code tarif **D**

Salvia x auriculata

famille : Lamiaceae

milieu :

géo : Espagne

hybride de *Salvia x fruticosa* x *Salvia officinalis*
Buisson de 0,80 à 1m en tout sens, au feuillage gris clair et au puissant parfum, persistant, très mellifère. Floraison abondante, bleu mauve, au printemps. Plein soleil, mi-ombre légère, massif, jardin naturel, grande rocaille, - 20°C. 1/m2

code tarif **D**

Salvia x 'Bee's Bliss'

famille : Lamiaceae

milieu :

géo : USA

Hybride de *S. sonomensis* x *S. leucophylla*,
Grande plante au port prostré de 20 à 40 cm de hauteur, 1,50 à 2 m de largeur. Feuillage persistant gris bleuté, dégageant une forte odeur musquée. Inflorescence d'une vingtaine de cm de longueur portant des glomérules de fleurs bleu clair avec des reflets violacés. Plante de plein soleil, -12°C au sec. 1/m2.

code tarif **E**

Salvia x microphylla 'Bordeaux'

famille : Lamiaceae

milieu :

géo : Horticole

Buisson de 50 cm à 90 cm de haut et de largeur, feuillage persistant, vert luisant et aromatique. Les fleurs sont pourpre bordeaux du printemps à l'automne. Plein soleil, mi-ombre, massif de vivaces, -15°C. 1 à 2/m2.

code tarif **D**

Salvia x jamensis 'La Siesta'

famille : Lamiaceae

milieu :

géo : Horticole

Grand buisson de 40 cm à 80 m de haut, feuillage persistant, vert luisant, aromatique. Les fleurs sont rose saumoné soutenu, au printemps et en fin d'été. Plein soleil. Massif de vivaces, potée, talus - 15°C. 1 à 3 /m2

code tarif **D**

Salvia x jamensis 'Cherry Queen'

famille : Lamiaceae

milieu :

géo : Horticole

Buisson de 40 à 60 cm en tout sens. Feuillage persistant, vert luisant, aromatique. Les fleurs sont rouge foncé du printemps à l'automne. Plein soleil, massif de vivaces, potée, -15°C. 1 à 3 /m2

code tarif **D**

Santolina benthamiana

famille : Asteraceae

syn. : *S. chamaecyparissus subsp. pecten*

milieu : garrigue

géo : Espagne, Pyrénées

Santoline vigoureuse au feuillage tomenteux gris vert, persistant. Forme un coussin de 40 cm de hauteur par 1m de largeur. Floraison blanc crème au printemps. Plein soleil, sol sec et bien drainé, massif de vivaces, rocaille, talus -15°C. 3 /m2

code tarif **E**

Santolina chamaecyparissus ssp. lindavica

famille : Asteraceae

milieu :

géo : pourtour méditerranéen

Coussin de 40 x 40 cm, persistant, feuille gris vert soutenu, découpée. Petites fleurs jaune pâle presque crème à la fin du printemps. Plein soleil, massif, rocaille, couvre sol. -15°C. 5 /m2

code tarif **D**

Santolina chamaecyparissus

famille : Asteraceae

milieu : coteaux arides, pentes rocailleuses

géo : Sud de l'Europe, Afrique du Nord

Coussin compact de 20 à 40 cm de hauteur par 40 à 80 cm de largeur. Feuillage gris argenté odorant. Floraison jaune en juin. Un sol très pauvre et sec est nécessaire pour conserver un port compact. Soleil. rocaille, massif de vivaces, talus. - 15°C. 3 /m2

code tarif **C**

Santolina corsica

famille : Asteraceae

milieu : terres incultes

géo : Corse, Sardaigne

Petit arbuste de 20 à 50 cm de hauteur et de largeur, feuillage compact, grisâtre, à l'odeur fortement terpénique. Floraison jaune en juin. Plein soleil, sol sec. Massif de vivaces, rocaille, talus.. -12°C. 3 /m2

code tarif **E**

Santolina magonica

famille : Asteraceae

syn. : *S.chamaecyparissus subsp.magonica*

milieu : falaise cotière

géo : Baléares

Coussin au port très compact et dense de 20 cm de hauteur par 40 cm de largeur, feuillage gris clair, persistant. Petites fleurs jaunes à la fin du printemps. Plein soleil, massif, rocaille, couvre sol. -12°C. 5 /m2

code tarif **E**

Santolina pinnata

famille : Asteraceae

milieu : roche et sol rocaillieux calcaires

géo : Italie

Petit coussin compact et persistant de 30 à 40 cm en tout sens. Feuillage gris, serré. Petite fleur jaune en fin de printemps. Très résistant à la sécheresse, plein soleil, -15°C. 5 /m2

code tarif **D**

Santolina rosmarinifolia forme bleuté

famille : Asteraceae

milieu : zones rocailleuses, rochers

géo : bassin méditerranéen

Coussin persistant de 40 cm environ en tout sens. Feuillage vert bleuté soutenu, très fin, odorant. Floraison jaune vif en début d'été. Très résistant à la sécheresse, plein soleil, massif, rocaille, couvre-sol, -15°C. 5 /m2

code tarif **D**

Santolina scariosa

famille : Asteraceae

syn. : *Chamaelum scariosum* *Cladanthus scariosus*

milieu : steppe, gypseuse du Moyen atlas

géo : Maroc

Coussin au port lâche de 20 cm de hauteur et 30 à 40 cm de largeur. Feuillage vert rappelant celui de la santoline. Fleur en forme de petite marguerite jaune d'or au printemps. Plein soleil, sol sec et bien drainé, rocaille, bord de muret, massif, -15°C . 5 /m2

code tarif **E**

Santolina squarrosa

famille : Asteraceae

syn. : *S.chamaecyparissus subsp.squarrosa*

milieu : garrigue, bord de chemin

géo : Espagne, sud de la France, Baléares

Santoline au feuillage vert olive, persistant, formant un coussin de 60 à 80 cm en tout sens. Abondante floraison de capitules jaune d'or à la fin du printemps, début d'été. Plein soleil, sol drainant, massif, rocaille, jardin naturel, couvre sol. -15°C. 3 /m2

code tarif **E**

Santolina virens

famille : Asteraceae

syn. : *Santolina viridis*

milieu : garrigue

géo : Sud de l'Europe

Santoline verdissante

Port en boule 30 à 40 cm de hauteur, 80 cm de largeur. Feuillage finement découpé vert foncé, très odorant, persistant. Floraison blanc crème en juin. Soleil, sol calcaire à argilo calcaire. Rocaille, massif, talus. -15°C. 3 /m2

code tarif **D**

Saponaria ocymoides

famille : Caryophyllaceae

milieu : éboulis, failles de roches, coteaux pierreux

géo : Europe

Coussin de 5 à 10 cm de hauteur. Longues tiges rampantes de 20 à 40 cm, feuillage vert, caduc en été en période de sécheresse, redémarre à l'automne. Abondante floraison de petites fleurs roses d'avril à mai. Plein soleil, sol très sec et bien drainé. Plante de rocaille, bord de mur, massif de vivaces. -15°C. 3 /m2

code tarif **D**

Sarcopoterium spinosum

famille : Rosaceae

milieu : Très fréquent dans les lieux rocailleux et arides, pentes rocailleuses, garrigue de 0 à 1200m d'alt.

géo : Grèce, Crete, Turquie, Chypre

Coussin d'une cinquantaine de cm de hauteur pouvant s'étaler sur un mètre de diamètre à la végétation dense et épineuse. Feuillage vert foncé, brillant, persistant mais altéré à partir de -10°C si le sol est mal drainé. Minuscules fleurs rouges ou blanches au printemps suivies de baies rouges très décoratives. Soleil, -10°C/-12°C, rocaille, talus, jardin de graviers, massif, sol pauvre et caillouteux.

code tarif **E**

Satureja x amoena

famille : Lamiaceae

hybride de *S. pygmaea* x *S. montana*

Feuillage vert sombre très aromatique 10 à 15 cm, de hauteur, 15 à 20 cm de largeur. Tiges au port dressé. Floraison mauve violacé à blanc en fin d'été début d'automne. Plein soleil mi-ombre. Massif de vivaces, talus, jardin aromatique. -15°C. 5 à 8 /m2

code tarif **E**

Satureja montana

famille : Lamiaceae

milieu : pente rocailleuse, coteaux arides

géo : Sud de l'Europe

Sarriette des montagnes

Feuillage vert sombre très aromatique, 15 à 20 cm de hauteur par 30 cm de largeur. Son port est étalé et ses tiges sont dressées. Floraison blanche en nuage en fin d'été automne. Plein soleil, mi-ombre, jardin d'aromatiques, talus, rocaille. -15°C. 5 à 8 /m2

code tarif **D**

Satureja montana ssp. illyrica

famille : Lamiaceae

milieu : prairie

géo : Sud de l'Europe

Sarriette à fleurs bleues

Feuillage vert sombre très aromatique. De 5 à 10 cm de hauteur, 15 à 20 cm de largeur, port plutôt étalé. Floraison bleue en fin d'été début d'automne. Plein soleil, mi-ombre. Jardin de plantes aromatiques, rocaille. -15°C. 5 à 8 /m2

code tarif **E**

Satureja obovata

famille : Lamiaceae

milieu : steppe

géo : Espagne

Feuille persistante, gris vert, ovale, glabre. Port érigé de 20 à 30 cm de hauteur, 30 à 40 cm de largeur. Floraison mauve violacé ou blanc crème en fin d'été début d'automne. Plein soleil mi-ombre, jardin d'aromatique, talus. -15°C. 5 à 8 /m2

code tarif **E**

Satureja spicigera

famille : Lamiaceae

milieu : Talus secs et érodés, éboulis,

géo : Ouest de l'Asie, Iran, Caucase

Feuillage vert foncé très aromatique de 10 à 15 cm de hauteur par 20 à 30 cm de largeur. Son port est arqué couvrant le sol. Floraison blanche en fin d'été, automne. Plein soleil, très résistante à la sécheresse, -15°C. Couvre sol, rocaille, massif. 3 à 5 /m2

code tarif **E**

Satureja thymbrafamille : **Lamiaceae**

milieu : brousaille ouverte et sèche entre 0 et 1900m d'alt.

géo : Grèce, Crète

Petit coussin de feuillage très odorant, gris vert, persistant 10 cm de hauteur 20 cm de largeur. Floraison rose moucheté de rose violacé au printemps. Rocaille, haut de muret, jardin de gravier. Soleil, sol rocailleux, - 12°C, 6 /m2

code tarif **E****Scabiosa cretica**famille : **Dipsacaceae**syn. : *Lomelosia cretica*

milieu : rocaille, falaise

géo : Bassin méditerranéen, Grèce

Arbuste de 40 à 60 cm de hauteur, 1 à 1,20 m de largeur, feuillage persistant vert, port naturellement en boule. Fleur bleu mauve au printemps donnant des fruits décoratifs. Plein soleil, sol drainé. Talus, massif de vivaces, couvre sol. -15°C. 1/m2

code tarif **D****Scabiosa cretica subsp.cretica**famille : **Dipsacaceae**

milieu : éboulis, falaise calcaire

géo : Crète

Même volume que la *Scabiosa cretica* mais son feuillage est plus argenté. Floraison mauve en fin de printemps. Soleil, -15°C. Massif, couvre sol, talus.

code tarif **E****Scabiosa minoana**famille : **Dipsacaceae**

milieu : falaise calcaire, de 400 à 1500m d'alt.

géo : Crète

Coussin persistant de 20 à 30 cm de hauteur, 40 à 50 cm de largeur aux feuilles vert grisé légèrement poilues. Floraison blanche au printemps suivie de fruits décoratifs. Plein soleil, sol drainé. Rocaille, massif, couvre sol -15°C. 3m/2

code tarif **E****Scilla peruviana**famille : **Hyacinthaceae**

milieu : Prairie, pâturage

géo : Espagne, Portugal, Afrique du Nord

Bulbeuse au feuillage de 15 à 20 cm de hauteur 20 à 30 cm de largeur, grosses feuilles vertes, luisantes, caduques en été.

Superbe floraison bleu soutenu au printemps d'une hauteur de 20 à 30 cm. Plein soleil, sol sec en été impérativement, bien drainé. Massif de vivace, recoin d'un dallage. -12°C. 5 /m2

code tarif **E****Scutellaria diffusa**famille : **Lamiaceae**

milieu : éboulis, broussailles

géo : Turquie

Couvre sol compact formant un tapis de 5 à 10 cm de hauteur, par 30 à 40 cm de largeur. Feuillage rond duveteux, persistant. La touffe est formée par de nombreuses tiges dressées. Fleur violette avec une macule blanche sur la lèvre inférieur en juillet. Plein soleil. Rocaille, jardin naturel, -15°C. 5 /m2

code tarif **E****Scutellaria oreophylla**famille : **Lamiaceae**

milieu : pente rocailleuse ensoleillées, Kabardino

Balkaria alt 2000m

géo : Nord Caucase

Couvre-sol de 10 à 20 cm de hauteur, par 40 à 60 cm de largeur. Longues tiges couvrant le sol au feuillage vert foncé caduc. Floraison en épi terminal jaune au printemps. Plein soleil, tout sol. Couvre sol, talus rocaille, bord de muret. - 20°C. 5 /m2

code tarif **E****Scutellaria suffrutescens**famille : **Lamiaceae**

milieu : Hauts plateaux

géo : Mexique

Coussinet de 5 cm de hauteur par 15 cm de largeur. Il forme un tapis dense de feuille gris vert, ovale, mat. Importante floraison rose fuschia de la fin du printemps à l'automne. Soleil, couvre sol, rocaille, jardin naturel, -15°C. 8 /m2

code tarif **E**

Sedum album

famille : Crassulaceae

milieu : Rochers, rocailles, murets

géo : Sud de l'Europe, Afrique du Nord

Plante de 0,5 cm à 1 cm de hauteur très couvrante, compacte. Feuilles persistantes, vertes du printemps à l'automne devenant rouge orangé avec le froid. Floraison blanche en juin. Soleil. Rocaille, toiture végétale, pot, joint de dallage. -15°C. 8 /m2

code tarif D

Sedum cauticola 'Robustum'

famille : Crassulaceae

syn. : *Sedum 'Ruby Glow'*

milieu :

géo : Horticole

Feuillage vert bleuté, rougissant à l'automne. Tiges retombantes de 15 à 20 cm, caduc. Floraison rouge pourpre en été. Port étalé, idéal pour les pots, bord d'un muret, rocaille, massif, plein soleil, - 15°C. 6 /m2

code tarif D

Sedum moranense

famille : Crassulaceae

milieu :

géo : Mexique

Petit sedum architecturé de 15 cm de hauteur, formant de larges touffes. Le feuillage est vert foncé du printemps à l'automne et devient rouge pourpre en hiver avec le froid, persistant. Floraison de petites étoiles blanches au printemps. Soleil, rocaille, pot, -10°C.

code tarif E

Sedum multiceps

famille : Crassulaceae

milieu : rocaille calcaire

géo : Algérie

Orpin à têtes nombreuses

Petite touffe de feuillage vert au port érigé et graphique. Feuillage composé de petites rosettes de feuilles aux extrémités des tiges. Peut être caduc en été par forte sécheresse. Floraison de petites étoiles jaunes au printemps. Soleil, rocaille, pot, -12°C.

code tarif E

Sedum palmeri

famille : Crassulaceae

milieu : montagnes

géo : Mexique

Sedum de 30 à 40 cm de hauteur par 40 à 60 cm de large. Feuilles charnues, en rosette au bout de chaque tige, de couleur vert tendre, l'extrémité des feuilles devient rouge avec le froid, persistantes. Ombelle de fleurs jaunes en fin d'hiver et printemps. Soleil, mi-ombre. Potée, massif de vivaces - 8°C. 5/m2

code tarif D

Sedum rupestre 'Angelina'

famille : Crassulaceae

milieu :

géo : Horticole

Sedum de 5 cm de hauteur, 20 cm de diamètre. Feuillage persistant variant du jaune au vert pomme, selon l'exposition, devenant orangé avec le froid hivernal. Floraison jaune en été de 10 à 15 cm de hauteur. Plein soleil ou mi-ombre. Potée, rocaille, massif de vivaces - 20°C. 8 /m2

code tarif D

Sedum sediforme

famille : Crassulaceae

syn. : *Sedum altissimum*

milieu : murs, rochers, lieux pierreux, rocailles

géo : Sud de l'Europe

Plante de 10 à 15 cm en tout sens, forme rampante aux extrémités remontantes, feuilles gris bleuté, persistantes. Les fleurs jaunes sont portées sur des tiges bien dressées en juin juillet. Forme une touffe étalée, très résistante à utiliser dans les situations difficiles. Toiture végétalisée, bord de muret, rocaille. - 15°C. 8 /m2

code tarif D

Sedum sexangulare

famille : Crassulaceae

milieu : talus rocaille, bord de route pelouse sèche de 0 à 1900m d'altitude

géo : Sud de l'Europe

Feuillage serré, les feuilles sont cylindrique. le feuillage rougis avec le froid. Les fleurs sont dressées sur des tiges de 5 à 15 cm de hauteur. Soleil, -20°C, rocaille, bord de muret, jardin de gravier.

code tarif D

Sedum takesinense

famille : Crassulaceae

milieu : steppe

géo : Asie

Vivace à la feuille grasse, vert vif, persistant, formant une touffe compact. Floraison jaune au bout de tiges arquées. Taillé après floraison pour garder une touffe compact. Soleil, mi-ombre, -15°C. massif, pot.

code tarif D

Sedum telephium subsp. maximum

famille : Crassulaceae

syn. : *Hylotelephium maximum*

milieu : Rocailles et bois clairs de 400 à 2000m d'altitude

géo : Sud de la France

Vivace à la souche tubérisée, le feuillage disparaît en hiver. Les tiges trapues sont dressées sont rougeâtre. Les feuilles grasses sont marquées d'une nervure centrale rougeâtre. Inflorescence en corymbe terminal de 2 à 10 cm de diamètre. Soleil, mi-ombre, -15°C. Rocaille, massif, jardin de gravier, pot.

code tarif D

Sedum x 'Autumn Joy'

famille : Crassulaceae

milieu :

géo : Horticole

Feuilles vert tendre, charnues, caduques atteignant 50 cm de hauteur en fin de saison., 20 à 30 cm de largeur. Floraison en panicules roses devenant pourpres en fin de floraison. Plein soleil, mi ombre dans le sud de la France. Massif de vivaces, potée... - 15°C. 5 /m2

code tarif D

Sedum x 'Matrona'

famille : Crassulaceae

milieu :

géo : Horticole

Feuillage pourpre atteignant 60 cm de hauteur, dressé, rigide, caduc. Floraison en large ombelles rose pâle virant au rose foncé en fin de floraison, fin de l'été début d'automne. Sol riche, plein soleil à mi ombre. Massif, potée. -15°C. 5 /m

code tarif D

Silène fruticosa

famille : Caryophyllaceae

milieu : falaise calcaire jusqu'à 600 m d'altitude

géo : Grèce, Crête, Sud Peloponnese,

Sous arbrisseau au feuillage persistant vert foncé. Fleur étoilée rose s'ouvrant le soir en mai juin, sur de longues tiges de 20 à 30 cm de longueur. Soleil, -12°C. Massif, rocaille, talus, jardin de gravier. 3/m2

code tarif E

Sisyrinchium striatum

famille : Iridaceae

syn. : *Phaiopses nigricans*

milieu :

géo : Argentine, Chili

Large feuilles ressemblant à des iris, mais plus tendre. Touffe de 30 à 40 cm de hauteur, compacte à développement rapide. Floraison blanc crème au printemps, plein soleil, mi-ombre. Massif de plantes vivaces. -15°C. 5 / m2

code tarif E

Sixalix farinosa

famille : Dipsacaceae

syn. : *Scabiosa farinosa*

milieu : Rupicole, pousse dans les falaises calcaires en bord de mer

géo : Tunisie, Algérie

Coussin compact de 30 à 50 cm de hauteur 50 à 80 cm de large, persistant. Les feuilles sont vert brillant aux bords crénelés. Floraison en capitules mauves portée au-dessus du feuillage au printemps . Plein soleil, sol très bien drainé. Rocaille, massif, couvre sol -8°C. 3m2

code tarif E

Stachys byzantina

famille : Lamiaceae

syn. : *S.lanata*

milieu : Friche, lisière de bois

géo : Pourtour méditerranéen, Asie Mineure

Oreille d'ours

Couvre sol de 5 à 10 cm de hauteur, feuillage gris blanc, duveteux, formant de large tapis. Floraison rose en mai juin sur des hampes florales charnues de 30 à 50 cm de hauteur. Soleil ou mi-ombre. Talus, couvre sol, rocaille, massif de vivaces. - 20°C. 5 /m2

code tarif D

Stachys citrina

famille : **Lamiaceae**

milieu : Falaises et éboulis calcaire entre 1500 et 2600m d'alt.

géo : Turquie

Feuillage de 5 à 7 cm de hauteur une vingtaine de cm de largeur, persistant, duveteux vert jaune, s'étalant lentement. Floraison jaune en épi à la fin du printemps. Terrain bien drainé en plein soleil. Rocaille, massif, jardin naturel, -15°C. 8 /m2

code tarif **E**

Stachys cretica

famille : **Lamiaceae**

milieu : Zone semi-aride ensoleillé, garrigue, prairie caillouteuse

géo : Pourtour Méditerranéen de la Grèce à Israël

Large coussin au feuillage duveteux, compact, gris vert de 10 cm de hauteur. Les feuilles sont beaucoup plus petites que le *S. byzantina*. Floraison rose sur des hampes de 0,40 à 1m de hauteur au printemps. Soleil. Massif, rocaille, jardin naturel -15°C. 5 /m2

code tarif **E**

Stachys inflata

famille : **Lamiaceae**

milieu : steppe

géo : Turquie, Iran

Feuillage gris blanc duveteux, feuilles linéaires, persistantes. Tiges dressées ligneuses à leur base de 30 à 40 cm en tout sens. Fleurs rose violacé à lèvres supérieures mouchetées portées par des hampes au port souple de 20 à 30 cm de longueur. Floraison au printemps. Plein soleil, sol bien drainé, rocaille, massif. -15°C. 5 /m2

code tarif **G**

Stachys sp. sp. 'Turquie'

famille : **Lamiaceae**

milieu :

géo : Turquie

Coussin de très petites feuilles duveteuses, gris vert s'étalant sur 30 cm de largeur, forme minuscule et compact 2 à 3 cm de hauteur. Floraison en épis épais rose pourprée de 20 à 30 cm de hauteur au printemps. Soleil, sol pas trop lourd, massif, rocaille, -15°C. 6 /m2

code tarif **E**

Stachelina petiolata

famille : **Asteraceae**

milieu : falaise, rocaille, pente abrupte - 100 à 1450 m d'alt

géo : Crète

Buisson compact et étalé de 0,10 à ,40 m de hauteur par 0,50 à 0,80m de large. Feuille ovale, glabre, verte au revers recouvert de duvet blanc, persistante. Fleur rose pâle en été. Soleil. Rocaille en pente, sol bien drainé. -15°C

code tarif **F**

Tanacetum argenteum ssp.canum

famille : **Asteraceae**

Achillea argentea

milieu : rocaille calcaire

géo : Turquie

Petit couvre-sol de 10 à 15 cm de hauteur, compact. Feuilles pennées, gris argenté, persistantes. Fleurs jaunes en capitule au printemps. Plantes pour sol rocailleux, calcaire en plein soleil. Couvre-sol, talus, rocaille. -20°C . 5 à 8/m2

code tarif **E**

Tanacetum densum subsp.laxum

famille : **Asteraceae**

milieu : Eboulie, rocher calcaire

géo : Turquie

Cousin au port dressé assez rigide s'étalant doucement en tapis. feuillage très découpé comme une plume gris devenant très blanc à la sécheresse. Fleurs jaunes en capitule au printemps. sol bien drainé au soleil. Couvre sol, rocaille. -20°C. 5/m2

code tarif **E**

Tanacetum densum ssp.sivasicum

famille : **Asteraceae**

milieu : Rocaille calcaire.

géo : Turquie, Darente 1600m

Coussin compact de 5 à 10 cm de hauteur. Feuillage fin très découpé ressemblant à une plume, plus petit que l'espèce précédente et d'un vert olive. Floraison très discrète. Petit couvre sol pour rocaille, plein soleil, -15°C. 6 /m2

code tarif **E**

Tanacetum densum subsp.amanii

famille : Asteraceae

syn. : *Chrysanthemum haradjanii*

milieu : pente rocheuse calcaire, cause calcaire, sol caillouteux, 1500 à 2500 m d'alti

géo : Asie MineureTurquie sud est

Tapis de feuillage de 10 cm de hauteur s'étalant en couvre sol large et compact. Vivace intéressante pour son feuillage blanc argenté, finement découpé, persistant. Très petites fleurs jaunes en capitule en mai juin. Sol sec et bien drainé indispensable au plein soleil. Excellent couvre sol, talus, rocaille. - 20°C. 5 /m2

code tarif D

Tanacetum praeteritum ssp massciticum

famille : Asteraceae

milieu : colline calcaire

géo : Turquie, Antalya,

Coussin de feuilles gris argenté de 15 à 20 cm de hauteur et 20 à 30 cm de largeur. Feuilles finement découpées persistante. floraison jaune en capitule au printemps. Sol bien drainé au soleil. Massif, rocaille, talus. -20°C 5/m2

code tarif E

Teucrium ackermanii

famille : Lamiaceae

milieu :

géo : Bassin méditerranéen

Coussin persistant de 10 cm de hauteur, 20 à 30 cm de largeur. Feuillage gris vert, petite feuilles linéaires. floraison rose violacé au printemps. Plein soleil, sol bien drainé indispensable pour une longévité plus importante. Rocaïlle, massif. -15°C. 8 /m2

code tarif E

Teucrium chamaedrys

famille : Lamiaceae

milieu : lieux arides

géo : Sud de l'Europe, Afrique du Nord

Germandrée petit chêne

Plante de 5 à 10 cm de hauteur, 10 à 30 cm de largeur s'étale par ses racines souterraines. Feuille verte, luisante au bord dentelé. Floraison rose au printemps. Plein soleil ou mi-ombre, sol bien drainé. Rocaïlle, couvre-sol, massif de vivaces. -15°C. 8 /m2

code tarif D

Teucrium creticum

famille : Lamiaceae

milieu : Phrygane, garrigue, forêt

géo : Grèce, Crète, Israël, Turquie

Germandrée à feuilles de romarin— Petit buisson dressé de 30 à 50 cm en tous sens. Feuille linéaire, vert foncé sur la face supérieure, blanche duveteuse sur la face inférieure. Inflorescences dressées pouvant atteindre 0, 75 à 1m de hauteur. Fleur rose à rose violacées au printemps et une partie de l'été. Plein soleil, sol bien drainé. rocaïlle, talus, massif.

code tarif F

Teucrium cossonii

famille : Lamiaceae

syn. : *Teucrium polium subsp.cossonii*

milieu : éboulis calcaire

géo : Espagne, endémiques des Baléares

Coussin persistant de 10 cm de hauteur, 20 à 30 cm de largeur. Feuillage gris vert clair, aromatique. Floraison rose au printemps. Plein soleil, sol bien drainé, rocaïlle, massif. -15°C. 5 à 8 /m2

code tarif E

Teucrium divaricatum

famille : Lamiaceae

milieu : pente sèche et oliveraie entre 0 et 1600m d'alti.

géo : Grèce,Péloponèse, îles de la mer Egée

Coussin de 10 à 50 cm en tout sens au feuillage vert brillant, persistant et aromatique. Floraison rose pourpre aux extrémités des tiges en mai juin. Soleil, -12°C, rocaïlle, massif.

code tarif E

T **Teucrium flavum**

famille : **Lamiaceae**

milieu : rocher, coteaux rocailleux

géo : Bassin méditerranéen

Feuillage persistant vert brillant, coriace très aromatique. Son port est dressé sur des tiges ligneuses de 10 à 40 cm de hauteur, 20 cm de largeur. Fleur jaune pâle sur de long épis de mai à juillet. Soleil ou mi-ombre. Massif au soleil ou à l'ombre, rocaille. - 15°C. 5 à 8 /m2

code tarif **D**

Teucrium hircanicum

famille : **Lamiaceae**

milieu : colline aride

géo : Caucase, Iran

Rosette de feuillage vert duveteux persistant sous forme de rosette très serrée en hiver. Fleurs en épis rouge violacé de 50 à 60 cm de hauteur à la fin du printemps, début de l'été. Plein soleil, massif, bordure - 20°C. 6 /m2

code tarif **D**

Teucrium marum

famille : **Lamiaceae**

milieu : coteaux arides et rocailleux

géo : bassin méditerranéen, Espagne à Dalmatie

germandrée des chats

La plante forme un coussin de 20 cm de hauteur et de 50 cm de largeur. Les feuilles sont petites, étroites, gris vert sur le dessus blanche sur le dessous, dégageant un parfum très puissant. Fleurs en épis terminales mauve à violacé en été. Rocaille, massif au soleil en sol sec. -15°C. 5 /m2

code tarif **E**

Teucrium orientale **var. glabrescens**

famille : **Lamiaceae**

milieu : Dans les forêts de Pinus nigra ouvertes, les pentes calcaires et steppes entre 800 et 3000 m d'altitude.

géo : Turquie, Liban, Iran, Palestines, Israël, Syrie

Plante vivace herbacée au feuillage vert, les tiges dressées peuvent atteindre 20 à 50 cm de hauteur et portent des fleurs bleues violacées au printemps et début d'été. Plein soleil ou ombre légère. - 15°C 5 /m2

code tarif **F**

Teucrium x lucydris

famille : **Lamiaceae**

milieu :

géo : Horticole

Hybride de T.chamaedrys x T.lucidum

Coussin de feuillage persistant vert foncé, denté, vernissé, de 20 x 40 cm. Petites fleurs rose vif aux extrémités des rameaux en fin de printemps, début d'été. Soleil mi ombre, sol sec, rocaille, massif, talus, excellent couvre-sol -15°C. 6 /m2

code tarif **D**

Thymbra capitata

famille : **Lamiaceae**

syn. : *Corydolithus capitata* *Thymus capitatus*

milieu : colline sèche, phrygane

géo : Grèce, Balkans

Petit arbuste au feuillage gris vert, aromatique, persistant, formant une boule de 40 à 50 cm en tout sens. Floraison bleu violacé en été. Rocaille, massif au soleil en sol sec, rocaille, jardin d'aromatiques, talus, -12°C. 5 /m2

code tarif **E**

Thymus baeticus

famille : **Lamiaceae**

milieu : matorral, sol rocailleux, thymée

géo : Espagne

Coussin à la base ligneuse et au port érigé de 15 à 50 cm de hauteur. Petites feuilles linéaires gris vert, duveteuses, à l'odeur citronnée. Floraison en capitules rose clair à blanc crème au printemps. Rocaille, jardin d'aromatique, jardin naturel, plein soleil, - 15°C. 4 à 5/m2

code tarif **E**

Thymus ciliatus

famille : **Lamiaceae**

milieu : garrigue, broussaille

géo : Maroc

Couvre sol de 3 à 5 cm de hauteur. Se développe en large tapis. Feuillage très poilu gris verdâtre. Perd ses feuilles en période de forte sécheresse. Floraison rose au printemps. Soleil, couvre sol, rocaille. -15°C. 8 /m2

code tarif **D**

Thymus cilicicusfamille : **Lamiaceae**

milieu : rocaille, bord de route, sol graveleux entre 70 et 2000m d'alt.

géo : Turquie, Anatolie

Thym formant un coussin dense d'une dizaine de cm de hauteur. Petites feuilles vertes, duveteuses, persistantes. Floraison rose magenta soutenu en mai, juin. Rocaille, jardin de coussin, plein soleil, - 15°C. 5 à 8/m2

code tarif **E****Thymus herba-baronna**famille : **Lamiaceae**

milieu : pentes arides

géo : Corse, Sardaigne

Thym très rampant, de 2 cm de hauteur. Sa feuille vert foncé dégage une odeur forte à associer aux viandes. Ses longues tiges forment un couvre sol large mais peu épais. Petites fleurs roses au printemps. Plein soleil ou mi-ombre légère. Jardin d'aromatiques, massif de vivaces. - 15°C. 5/m2

code tarif **E****Thymus hyemalis**famille : **Lamiaceae**

milieu : matorral clair, thymée,

géo : Espagne et Afrique du Nord

Coussin de 15 à 50 cm suivant les sols, Tiges pubescentes, feuilles ovales vert gris. Floraison rose au printemps. Rocaille, jardin naturel, jardin d'aromatiques, plein soleil, - 15°C. 4 à 5/m2

code tarif **E****Thymus longicaulis**famille : **Lamiaceae**

milieu : rocailles, pelouses en montagne

géo : Europe

Thym rampant à petites feuilles vertes, étroites. Ses tiges sont longues et arquées, elles forment de larges tapis denses de 15 à 20cm de hauteur. Floraison rose vif au printemps. Couvre-sol, bordure, soleil, - 15°C. 5/m2

code tarif **D****Thymus longiflorus**famille : **Lamiaceae**

milieu : matorral clair, friches, talus rocailleux

géo : Espagne, Sierra Nevada

Thym très ramifié formant un coussin érigé de 15 à 30 cm de hauteur. Petites feuilles lancéolées, vertes, persistantes. Floraison particulière de mai à juillet. Les fleurs tubulaires rose magenta soutenu sont entourées de larges bractées vert rose. Rocaille, jardin naturel, plein soleil, - 15°C. 4 à 5/m2

code tarif **F****Thymus mastichina**famille : **Lamiaceae**

milieu : friches, bords de chemin

géo : Espagne, Afrique du Nord, Portugal

Feuillage gris vert à l'odeur terpénique puissante de 20 à 30 cm dans tous les sens. Floraison sphérique jaune verdâtre, duveteuse en mai juin. Plein soleil, ou ombre légère. Rocaille, jardin naturel, massif, - 15°C. 6/m2

code tarif **F****Thymus sipyleus var. davisianus**famille : **Lamiaceae**

milieu : pentes rocailleuses, steppes de montagne

géo : Turquie

Coussin dense de 5 à 7 cm de hauteur. La plante s'étale pour former un tapis d'une vingtaine de cm. Ses tiges sont dressées et ses feuilles très serrées, poilues, vert soutenu. Floraison blanche au printemps. Caduc par forte sécheresse. Rocaille, sol sec et caillouteux indispensable, plein soleil, - 15°C. 4 à 5/m2

code tarif **E****Thymus spinulosus**famille : **Lamiaceae**

milieu : Pentes arides et rocailleuses

géo : Italie, sud de la France

Plante couvre sol vigoureuse de 1 à 3 cm de hauteur. Tiges rougeâtres longues et très vigoureuses formant un large tapis peu dense. Petites feuilles vert foncé poilues à leur base. Floraison blanc rosé au printemps. Plein soleil, rocaille sèche. - 15°C. 5 à 8/m2

code tarif **D**

T
<
V

Thymus vulgaris

famille : Lamiaceae

milieu : garrigue, coteaux arides

géo : Espagne, sud de la France, Italie

Thym de 10 à 20 cm en tout sens. Feuillage compact, persistant mais caduc par forte sécheresse, gris, très aromatique. Floraison rose en avril mai. Rocaille, massif, pot, plein soleil, sol sec et bien drainé. - 20°C. 6 /m2

code tarif D

Thymus vulgaris⁺ Alba⁺

famille : Lamiaceae

milieu : garrigue, coteaux arides

géo : Méditerranée

Identique au Thymus vulgaris, toujours très aromatique. Floraison blanche d'avril à juin. Rocaille, aromatique, jardin de coussin, pot, plein soleil, sol pauvre et bien drainé. - 20°C.

code tarif D

Thymus zygis

famille : Lamiaceae

syn. : *T. tenuifolius* var. *gracilis*

milieu : garrigue peu évoluée, entre 10 & 2000m d'alt.

géo : Espagne et Afrique du Nord

Coussinet érigé de 10 à 30 cm au feuillage gris vert tomenteux. Floraison blanche au printemps et début d'été. Soleil, sol sec et drainant, -12°C. Rocaille, Massif, couvre sol.

code tarif E

Trifolium rubens

famille : Fabaceae

milieu : Bois et rocaille de 200 à 1600 m d'altitude

géo : Europe

Plante au port dressé d'une cinquantaine de cm de hauteur et au feuillage vert. Les inflorescences terminales sont allongées, duveteuses de couleurs rose pourpre en début d'été. Soleil, mi-ombre, -20°C, prairie naturelle, talus, massif de vivaces, jardin de graviers.

code tarif D

Vella spinosa

famille : Brassicaceae

milieu : Matorral sec d'altitude, rocaille entre 1300 et 2200m.

géo : Espagne

Coussin de 60 à 70 cm de hauteur pouvant s'étaler d'autant à la végétation dense et épineuse. Feuillage gris vert, persistant. Fleur jaune au printemps. Soleil, sol bien drainé, rocaille, bord de muret, jardin de coussins. -15°C.

code tarif F

Verbascum dumulosum

famille : Scrophulariaceae

milieu : crevasse rocheuse, ruine de l'ancienne ville de Termessus

géo : Turquie

La plante forme un coussin de 30 cm en tout sens au feuillage vert doré très duveteux. Il se couvre de fleurs jaune vif de mai à juillet. Soleil, sol pauvre et rocailleux, rocaille, jardin naturel. - 15°C.

code tarif F

Verbascum spinosum

famille : Scrophulariaceae

milieu : pelouse sèche

géo : Crète

Coussin très compact de feuilles grises. Sa croissance est lente mais la plante forme une touffe de 50 cm à 1 m de diamètre par 20 à 40 cm de hauteur. Les hampes florales séchées donnent l'impression d'épines peu agressives. La floraison jaune se développe à une vingtaine de cm au-dessus du feuillage au printemps. Plein soleil, un sol rocailleux est indispensable pour que la plante supporte l'hiver humide, - 15°C, 1 à 5 /m2

code tarif F

Verbena bonariense

famille : Verbenaceae

milieu :

géo : Amérique du Sud

Feuillage en rosette, rugueux, vert foncé, caduc, développant de grandes hampes florales raides de 1 à 1,50 m. Floraison aérienne violette en épis terminaux de mai à septembre. Plein soleil. Fleurie très longtemps en sol pas trop aride. Massif de vivaces, prairie naturelle. -10°C. 5 à 8 /m2

code tarif D

Veronica dichrus

famille : Scrophulariaceae

milieu : pente rocailleuse

géo : Turquie

Vivace couvre sol au feuillage vert de 5 cm par 80 cm. Tapis de fleurs rose mauve au printemps. plein soleil, Talus, rocaille, dallage, jardin de gravier. -15°C 3 à 5/m2

code tarif E

Veronica peduncularis 'Georgia Blue'

famille : Scrophulariaceae

syn. : *Veronica umbrosa* 'Georgia Blue'

milieu :

géo : Horticole

Vivace couvre sol, beau feuillage rougeâtre en hiver verdissant au printemps et pendant l'été. Tapis de fleurs bleu foncé de mars à fin mai.

Plein soleil, très résistante à la sécheresse, rocaille, massif, -20°C. 5 à 8 /m2

code tarif E

Veronica polifolia

famille : Scrophulariaceae

milieu : rocaille, pente, de 20 à 2000.m d'alt

géo : Turquie, Liban, Syrie

Petite vivace en coussinet persistant de 50 à 10 cm de hauteur par 30 de large. Feuille gris vert, tomenteux. Fleurs bleu clair en mai, juin. Plein soleil, rocaille, jardin de gravier, -20°C.

code tarif E

Zauschneria californica subsp.mexicana 'Western Hills'

famille : Onagraceae

milieu :

géo : Horticole

Feuillage caduc, gris vert plus large que le type, grandes tiges partant du sol de 40 à 60 cm de hauteur portant les fleurs. Floraison tubulaire rouge vermillon lumineuse de juillet à octobre. Plus florifère et plus compact que Z. californica. Plante qui drageonne, plein soleil, talus, massif, rocaille, jardin naturel, -15° C. 5 /m2

code tarif E

Zauschneria californica subsp.mexicana 'Olbrich Silver'

famille : Onagraceae

milieu :

géo : Horticole

Feuillage caduc, gris bleuté plus large que le type, grandes tiges partant du sol de 40 à 60 cm de hauteur portant les fleurs. Floraison tubulaire rouge orangé très lumineuse de juillet à octobre. Plante qui drageonne, plein soleil, talus, massif, rocaille, jardin naturel, -15° C. 5 /m2

code tarif E

Zauschneria californica subsp.mexicana 'Sierra Salmon'

famille : Onagraceae

milieu :

géo : Horticole

Feuillage caduc, gris vert plus large que le type, grandes tiges partant du sol de 40 à 60 cm de hauteur portant les fleurs. Floraison tubulaire rose saumoné de juillet à octobre. Plante qui drageonne, plein soleil, talus, massif, rocaille, jardin naturel, -15° C. 5 /m2

code tarif E

Zauschneria californica 'Alba'

famille : Onagraceae

milieu : bord de ruiseaux

géo : Californie

Forme à fleurs blanche beaucoup moins vigoureuse et plus rampantes; hauteur en fleur 20 cm, largeur 50 cm . Rocaille, massif de vivaces. - 12°C

code tarif E




Achillea cretica



Dorycnium pentaphyllum



Capparis spinosa



Vivaces et graminées



Phlomis herba-venti



Echinops viscosus sbsp. *macrolepis*



Ebenus creticus



Globularia alypum



Dianthus libanotis



Plantes couvre sol



Zauschneria californica «Western Hills»



Verbascum spinosum



Coussins bord de restanque



Stipa gigantea, *Echinops viscosus* subsp. *macrolepis*



Stipa tenuifolia, *Dianthus carthusianorum*



Hypparrhenia hirta

les graminées

Les graminées sont ces herbes gracieuses présentes dans les prairies, les pelouses naturelles et les rocailles. Très prisée des jardins contemporains, elles sont de plus en plus populaire jusqu'à en devenir aujourd'hui incontournables.

Leur engouement pour leur esthétique ornementale s'explique par la diversité de leurs formes, leurs couleurs étonnantes et leurs facilité d'emplois.

Elles trouveront une place aussi bien associées à des vivaces, que regroupées entre elles. Ces belles herbes contribueront à donner un style naturel et léger au jardin.

La gamme de graminées proposée dans le catalogue est résistante à la sécheresse, adaptable à de nombreux type de sol et facile d'entretien.



Mulhenbergia emersleyi



Mulhenbergia capillaris



Mulhenbergia dubia

Achnaterum calamagrostis

famille : Poaceae

syn. : *Stipa calamagrostis*

milieu : talus, pente caillouteuse,

géo : Europe centrale, Europe du Sud

Beau feuillage vert tendre au printemps prenant une superbe coloration automnale. Plante de 70 cm à 1 m de hauteur, floraison en épi doré de juin à juillet, les floraisons persistent jusqu'en automne. Plein soleil, talus, massif de vivaces, isolé. -25°C. 3 /m2

code tarif **D****Chrysopogon gryllus**

famille : Poaceae

milieu : pelouse

géo : Asie Centrale, Sud de la France, Caucase, Chine

Plante vivace se développant en touffe compacte, ses feuilles sont aplaties. La floraison s'élève sur de hautes tiges de 1,20 à 1,50m. Des panicules violacées très élégantes s'épanouissent au printemps. Soleil, prairie naturelle, massif de vivaces. -20°C, 3 à 5 /m2

code tarif **E****Eragrostis curvula**

famille : Poaceae

syn. : *Eragrostis robusta*

milieu : prairies pâturées, lieux perturbés, bord de chemin de 0 à 3000m d'alt.

géo : Sud de l'Afrique

Feuillage vert passant au bronze en été et automne, 1 m de hauteur 0,80 de largeur en fleur. Inflorescences légères presque noires se courbant gracieusement en fin de printemps. Rabattre en fin d'hiver. Plein soleil, sol sec. Massif de vivaces -15°C. 3 /m2

code tarif **D****Eragrostis elliottii**

famille : Poaceae

milieu : prairie, lisière de forêt de chêne, plaine côtière, de 0 à 150m d'alt

géo : Sud-est des USA, Amérique Centrale

Plante de 0,80 à 1 m de hauteur. Feuillage bleuté, léger. Floraison presque permanente du printemps à l'automne, très aérienne et transparente. Rabattre au début du printemps. Plein soleil. -15°C 3 /m2

code tarif **E****Eragrostis trichodes**

famille : Poaceae

syn. : *Eragrostis pilifera* *Poa trichodes*

milieu : bord de chemin, bois ouvert sur sol sablonneux, prairies graveleuses de 100 à 2150m d'alt.

géo : Texas, Colorado

Herbe de 60 à 80 cm en fleur, touffe de feuillage à la base vert clair. Sèche pendant l'hiver. Les inflorescences forment un nuage violet pourpre de la fin de l'été à l'automne. Soleil, sol bien drainé, -20°C. 5 /m2

code tarif **D****Erianthus ravennae**

famille : Poaceae

syn. : *Saccharum ravennae*, *Andropogon ravennae*

milieu : bord de route, site ouvert, champs, berges sablonneuses

géo : bassin méditerranéen Afrique du Nord

Canne d'Italie

Plante de 3 à 4 m en fleur, inflorescences plumeuses se développant fin août, début septembre, feuillage rougissant en automne. Rabattre en fin d'hiver. Plein soleil, -15°C. 1 /m2

code tarif **D****Festuca actae**

famille : Poaceae

milieu : Sur les rochers, affleurements rocheux, falaises, éboulis et pentes stabilisés

géo : Nouvelle Zélande

Touffe compacte de 15 à 20 cm de hauteur et de largeur au feuillage bleu électrique, persistant. Inflorescence blonde au printemps. Soleil, rocaille, couvre-sol, -15°C°. 5 à 8 /m2

code tarif **E**

F Festuca ovina 
 famille : Poaceae
 milieu : pelouse, lande
 géo : Europe
 Touffe compacte de 10 à 30 cm de hauteur et de largeur au feuillage vert bleuté, persistant. Inflorescence verte ou violacée au printemps. Soleil, mi-ombre, rocaille, couvre-sol, -15°C. 5 à 8 /m2

code tarif **D**

M Hyparrhenia hirta 
 famille : Poaceae
 milieu : lieux secs et arides, garrigue
 géo : Bassin méditerranéen
 Graminée au port dressé de 0,50 à 1,20 de hauteur. Feuillage très graphique au reflet bleuté pouvant prendre des colorations orangés à l'automne. Floraison rougeâtre à étamines jaunes. soleil ou mi-ombre. Talus, rocaille, massifs. -15°C. 3 /m2

code tarif **D**

Lygeum spartum

famille : Poaceae
 milieu : steppe
 géo : Espagne (sud et sud est) et Afrique du Nord
 Feuillage vert persistant, tiges arrondie formant des touffes denses au port rigide de 50 à 70 cm de hauteur, la plante se développe lentement grâce à ces puissantes racines. Floraison argentée en bec d'oiseaux en mai. Excellente plante pour stabiliser les talus, massifs. Plein soleil, -15°C. 5 /m2

code tarif **D**

Melica bauhini

famille : Poaceae
 milieu : Département du Var, éboulis, talus rocailleux
 géo : Sud de la France
 Feuillage vert très fin en touffe compacte, Superbe floraison en panicule souple. Plante adaptée aux sols rocailleux, murs en pierre, éboulis. Plein soleil. - 15°C, 5 /m2

code tarif **D**

Melica ciliata

famille : Poaceae
 milieu : garrigue, lieux secs et arides
 géo : Sud de l'Europe, Afrique du Nord
 Feuillage fin, vert, en touffe de 15 à 20 cm, Inflorescence en panicules serrées, plutôt dressées, presque blancs, soyeux au début du printemps, 40 à 60 cm en fleur. Plante adaptée aux sols très pauvres, secs et bien drainés. Elle est de courte vie mais se ressème au jardin. Plein soleil. - 15°C. 5 /m2

code tarif **D**

Muhlenbergia capillaris

famille : Poaceae
 syn. : *M. filipes*
 milieu : prairie sèche, côtes rocailleuses calcaire ou argileux, forêt ouvertes de 0 à 500m d'alt.
 géo : Ouest des USA, Mexique, îles des Caraïbes
 Touffe de 50 cm en tout sens, feuillage fin vert brillant. Floraison en masse gracieuse de couleur rose vif d'1 m de haut de septembre à novembre. A besoin, d'un orage ou d'un arrosage pour déclencher sa floraison. Plein soleil et ombre légère. -15°C. 5 /m2

code tarif **D**

Muhlenbergia dubia

famille : Poaceae
 milieu : affleurements rocheux, pentes rocailleuses calcaires dans les montagnes de Trans-Peco entre 1500 et 2000m d'alt
 géo : Texas, Nouveau Mexique, Arizona
 Touffe dense de 50 cm de feuillage fin vert clair aux reflets gris bleuté. Inflorescence gris argenté, raide, très étroite, très graphique atteignant 60 à 90 cm de haut de septembre à novembre. Plein soleil. -12°C. 3 à 5 /m2

code tarif **E**

Muhlenbergia emersleyi

famille : Poaceae
 milieu : pentes rocheuses, flancs de côtes, canyons, falaises calcaires, entre 1200 et 2500m
 géo : Arizona, Texas, Nouveau Mexique
 Touffe de feuillage vert gris de 50 cm, surmonté de larges inflorescences très droites, pourpre grisâtre, jusqu'à 1 m de hauteur d'août à novembre. Plein soleil ou ombre légère, résistante à la sécheresse, - 12°C. 5 /m2

code tarif **E**

Muhlenbergia reverchonii

famille : Poaceae

milieu : Pentes calcaires, rocaillies, affleurement rocheux

géo : Texas, Oklahoma

Touffe de feuillage de 50 à 80 cm de hauteur, persistant, floraison en panicule rose plus précoce que *M. capillaris*. Feuillage moins coriace. Plus adapté aux climat froid. Talus, massif, rocaille. -15°C 3 à 5 m/2

code tarif E

Panicum virgatum 'Dallas Blue'

famille : Poaceae

milieu :

géo : Horticole

Grande plante dressée pouvant atteindre 1,5 m et plus, superbe feuillage bleuté. Floraison beige rosé en fin d'été. plein soleil, - 15°C. 3 à 5 m/2

code tarif E

Pennisetum orientale

famille : Poaceae

syn. : *Pennisetum setaceum var. orientale*

milieu : Steppes arbustives, affleurements rocheux des zones steppiques

géo : Asie Centrale Nord des Indes

Feuillage souple, vert, séchant en hiver. Magnifique floraison d'épis plumeux blanc rosé, dressés de 50 à 80 cm en tout sens en mai à octobre. La floraison s'arrête en été en cas de sécheresse. Croissance lente. - 15°C. 5 m/2

code tarif D

Pennisetum orientale 'Karley Rose'

famille : Poaceae

milieu :

géo : Horticole

Feuillage souple de 80 cm de hauteur vert, séchant en hiver. Magnifique floraison d'épis plumeux pourpre rosé au port souple, de mai à octobre. La floraison s'arrête en été en cas de sécheresse importante. soleil, - 15°C. 5 m/2

code tarif D

Pennisetum villosus

famille : Poaceae

syn. : *Pennisetum villosus var. humile*

milieu : montagnes arides, naturalisé sur les bords de routes dans de nombreux pays du bassin méditerranéen

géo : Nord de l'Afrique, Péninsule Arabique

Feuillage fin de 15 à 20 cm de hauteur formant un tapis vert du printemps à l'automne. Se développe grâce à ses rhizomes traçants. Floraison d'épis blancs cylindriques, très doux et duveteux, de juin à novembre. Espèce pouvant être envahissante en climat doux. Bon couvre sol pour terrain poreux et exposition chaude, -10°C. 5 m/2

code tarif D

Pipthatherum miliaceum

famille : Poaceae

milieu : Terrains vagues, friches, bords de chemin, rocaillies entre 20 et 500m d'alt.

géo : Bassin méditerranéen, sud de la France

Magnifique port léger et gracieux aux tiges décoratives rappelant celles du bambou. D'une hauteur de 1 à 1,20 m. Floraison légère et abondante de juillet à octobre, se ressème facilement au jardin en climat doux. Décorative toute l'année. Très résistante à la sécheresse et adaptée à l'ombre légère sèche, -12°C. 3 m/2

code tarif D

Poa labillardieri

famille : Poaceae

milieu : bois ouverts, ravines

géo : Nouvelle Zélande, Sud est de l'Australie

Touffe de feuillage au reflet bleuté du printemps à l'automne et doré en hiver, 90 cm à 1 m de hauteur et de largeur. Floraison de fins épis rigides blond cendré en juin, juillet. Décorative toute l'année. -15°C. 1 m/2

code tarif D

S Schizachyrium scoparium

famille : Poaceae

syn. : *Andropogon scoparius*

milieu : prairies, bois ouverts, collines sèches.

géo : Amérique du nord

Feuillage vert à vert glauque, superbe coloration orange pourpre en automne, 60 cm à 1 m de hauteur. Floraison en août septembre. Intéressante pour la couleur de son feuillage. Plein soleil, sol bien drainé, - 20°C. 5 à 8 /m2

code tarif D

Stipa barbata

famille : Poaceae

milieu : garrigue, entre les thymes dans les rocaillies entre 400 et 1100m d'alt.

géo : Sud de l'Europe, Espagne

Longues tiges souples de 60 à 80 cm de longueur en fleur, floraison à la fin du printemps et début d'été avec de longues arêtes argentées d'environ 20 cm. Port dressé. plein soleil, - 15°C. 5 à 8 /m2

code tarif E

Stipa gigantea

famille : Poaceae

milieu : pâturages de moyenne montagne entre 900 et 1200m

géo : Espagne, Portugal, Maroc

Touffe de feuilles vertes, persistantes atteignant 50 à 70 cm en tout sens. Magnifique floraison d'épillets dorés spectaculaires de 2 m de hauteur en mai juin. Soleil, mi-ombre. - 15°C. 1 /m2

code tarif D

Stipa hyalina

famille : Poaceae

milieu : Broussaille, pâturage, friche, bois ouvert

géo : Amérique du Sud

Plante de 80 cm à 1 m de hauteur et 1,50 de largeur en fleur, floraison très légère de longues arêtes plumeuses de 10 à 15 cm. Très élégante au printemps. Port souple et large. Plein soleil, très résistante à la sécheresse, - 15°C. 3 /m2

code tarif E

Stipa juncea

famille : Poaceae

milieu : Garrigue pierreuse, coteaux érodé.

géo : Méditerranée

Touffe de feuilles vertes, persistantes atteignant 50 à 70 cm en tout sens. Magnifique floraison d'épillets dorés spectaculaires de 2 m de hauteur en mai juin. Soleil, mi-ombre. - 15°C. 1 /m2

code tarif D

Stipa pennata

famille : Poaceae

milieu : pelouses sèches, calcaire

géo : Europe centrale, Europe du Sud

Herbe aux plumets

Stipe de 50 à 70 cm de hauteur, floraison avec de longues arêtes plumeuses pouvant atteindre 15 à 30 cm, feuillage vert gris. Port souple. Plein soleil, sol sec. - 15°C. 5 /m2

code tarif D

Stipa tenacissima

famille : Poaceae

milieu : talus rocaillieux, pâturage de basse montagne, 0 à 1500m d'alt.

géo : Espagne, Afrique du Nord

Touffe de feuillage de 20 à 60 cm en tout sens. Feuille verte, persistante fine, ondulé et coriace. Inflorescence blanc doré de 0,60 à 1,50 m en fin de printemps et début d'été. Croissance lente. Sol très bien drainé en plein soleil, -15°C. 5 à 8 /m2

code tarif E

Stipa tenuifolia

famille : Poaceae

syn. : *Nassella tenuissima*, *Stipa tenuissima*

milieu : forêts ouvertes, pentes rocheuses

géo : Sud-ouest des USA, Mexique

Herbe de 40 à 60 cm, floraison légère et argentée en mai juin. Feuillage persistant au port raide, jaunissant en hiver. Idéale plantée en masse. Espèce pouvant être envahissante, à surveiller. Plein soleil, sol drainé, - 15°C. 5 /m2

code tarif D



Cistus x ultraviolaceus, *Cistus x purpureus*



Malacothamnus aboriginum



Genista umbellata




Rosa sempervirens «prostrata»

les arbustes

Arbuste et arbrisseaux, persistant, caduc ou à fleur, sont les composants essentiels des bois et de la garrigue. Ils organisent les vastes étendus paysagère méditerranéenne de la montagne à la mer. Anciennement cultivé dans les jardin, ils sont devenu au fils des siècles les pièces structurantes du jardin.

Planté en haie ou en labyrinthe, les persistants demeure les grands classiques incontournables des compositions paysagère. Arbrisseaux et arbustes à fleurs n'ont de cesse d'être mis en scène au sein des massifs de vivaces et des bosquets. Les caducs au feuillage flamboyant d'automne sont la dernière touche du peintre dans son jardin....

Les arbustes et arbrisseaux proposés dans le catalogue sont acclimaté aux conditions de sécheresse méditerranéenne. L'ensemble de la gamme est adaptable à de nombreuses situations dans le jardin, tous préférant un sol calcaire à neutre.



Rosa xanthina, *Ceanothus arboreus* 'Trewithen blue'



Cotinus coggygria



Cistus x purpureus 'Alan Fradd'

Abelia 'Edouard Goucher'

famille : Caprifoliaceae

milieu :

géo : Horticole

hybride de A x grandiflora x A.schumanii

Arbuste en tout sens d'1,50 à 2m au feuillage vert vernissé, semi-persistant. Fleurs en clochettes rosées, mouchetées de rose foncé de juillet à octobre. Soleil ou mi-ombre, massif d'arbuste, pot, -15°C. 1 /m2

code tarif **D**

Abelia chinensis

famille : Caprifoliaceae

milieu :

géo : Chine

Arbuste caduc ou semi persistant en climat doux. Port compact, étalé d'1m à 1,50 m en tout sens. Belle feuille vert luisant devenant brun pourpre avec le froid. Floraison blanche de la fin du printemps à l'automne. Haie basse, massif, pot. Plein soleil ou mi-ombre, -12°C 1 /m2

code tarif **E**

Abelia mosanensis

famille : Caprifoliaceae

milieu :

géo : Chine, Nord de l'Asie

Arbuste d'un 1m à 1,50 m en tout sens au port souple. Feuillage vert brillant caduc. Floraison blanche au printemps, bouton florale rose soutenu, très odorant. Soleil, mi-ombre, -15°C. 1/m2

code tarif **E**

Abelia triflora

famille : Caprifoliaceae

milieu : fourrés secs, pentes rocailleuses

géo : Afghanistan, Népal

Arbuste caduc de 2 à 3m de hauteur. Belle feuille ovale verte. Floraison blanche parfumée, au printemps. Port lâche. Haie libre, massif. Soleil ou mi-ombre légère, isolé, haie, -15°C, 1 /m2

code tarif **E**

Acer obtusifolium

famille : Aceraceae

syn. : A. syriacum

milieu : Kalepanayotis, 830m alt., dans les forêts de pin, dans les montagnes rocailleuses, en bord de champs

géo : Chypre, Liban, Israël, Syrie

Erbale de Chypre - Large arbuste ou petit arbre pouvant atteindre 6 à 8 m de hauteur, feuillage persistant ou semi-persistant sous climat froid. Feuilles coriaces, vertes vernissées gris vert au dessous, trilobées. Floraison jaune verdâtre en corymbes au début du printemps. Soleil, mi-ombre, -15°C. Haie libre, bosquet d'arbustes, isolé.

code tarif **G**

Adenocarpus decorticans

famille : Fabaceae

milieu : montagnes du sud

géo : Espagne

Buisson dressé de 1,50m à 3m, en tout sens. Feuilles fines gris vert, soyeuses, persistantes. Floraison en grappes jaunes orangés au printemps. Fruits en forme de gousses allongées, verruqueuses et très collantes. Soleil, sol bien drainé. Talus, haie, isolé, grande rocaille, -12°C

code tarif **G**

Amelanchier ovalis

famille : Rosaceae

syn. Amelanchier mucronata

milieu : fourrés arbustifs, coteaux secs et pierreux de montagne

géo : Europe du sud, Afrique du nord, Asie Mineure

Amélanchier des bois - Arbuste érigé, caduc de 2 à 3 m de hauteur. Feuilles ovales, coriaces, vert foncé au revers gris tomenteux. Bourgeon blanc laineux, feuille rouge à orangé en automne. Floraison blanche au printemps suivie de fruit bleu foncé à la saveur sucré. Soleil, mi-ombre légère, sol drainant. Bosquet d'arbustes, haie mixte. 15°C

code tarif **F**

A Anisodonteia malvastroides

famille : Malvaceae

milieu :

géo : Afrique du sud

Petit arbuste ressemblant à une lavatère au port léger de 1,50 à 2m en tout sens. Feuilles lobées, gris vert, persistantes. Fleur de mauve rose clair veinée de rose plus foncé, printemps et en fin d'été, toute l'année en climat doux. Soleil, mi-ombre légère, sol drainé, sec, -12°C/-15°C.

code tarif E

Anthyllis hermanniae

famille : Fabaceae

milieu : garrigue, rocaille, entre 200 et 1600m

géo : Pourtour méditerranéen, Corse

Petit buisson de 0,30 à 1m en tout sens, aux feuilles simples et aux rameaux dressés. Fleurs jaune vif regroupées par 2 ou 5, de mai à juin. Plein soleil, sol pauvre et très drainant, rocaille, jardin naturel -15°C. 1 à 3/m2

code tarif E

Arbustus x andrachnoides

famille : Ericaceae

milieu :

géo : Grèce,



Hybride entre le A. andrachne & A.unedo. Arbuste de 4m de hauteur. Feuillage vert sombre, lisse persistant. Magnifique écorce rouge orangé qui s'exfolie. Floraison blanche en fin d'automne. Soleil ou mi-ombre, isolé, haie, bosquet d'arbustes, - 15°C.

code tarif F

Arbustus andrachne

famille : Ericaceae

milieu : garrigue, forêt sèche

géo : Grèce, Chypre, Turquie

Arbousier de Chypre

Arbuste de 6 à 8m de hauteur environ à l'écorce lisse et orangée s'exfoliant. Grandes feuilles vertes à bords lisses, persistantes. Petites fleurs blanches à verdâtres à la fin du printemps ; suivies de fruits rouges, mûrissant à l'automne. Soleil, mi-ombre, croissance lente, sol sec , isolé, haie, bosquet d'arbustes, -15°C.

code tarif H

Arbustus unedo

famille : Ericaceae

milieu : maquis, hêtraie sèche, pinède

géo : Bassin méditerranéen occidentale

Arbousier

Arbuste de 3 à 5m de hauteur environ à l'écorce rougeâtre. Feuille verte, lisse aux bords dentés, persistantes. Petites fleurs blanc rosé regroupées en panicules à la fin de l'automne. Fruits rouges, granuleux murissant l'automne suivant. Soleil, mi-ombre, sol pauvre et peu alcalin. Isolé, haie, bosquet d'arbustes, -15°C.

code tarif E

Arbustus xalapensis var.texana

famille : Ericaceae

syn. : *Arbustus texana*

milieu : Canyons, plaines ouvertes, sur sol rocheux et calcaire

géo : Texas, Nouveau Mexique, Mexique

Arbuste au feuillage ovale, vert soutenu, vernissé, persistant, pouvant atteindre 3 à 5 m. Fleur blanche de février à avril suivi de baie rouge orangé. Soleil, sol bien drainé, isolé, bosquet d'arbustes -15°C.

code tarif H

Artemisia arborescens

famille : Asteraceae

milieu : rochers maritimes, chaméphytaie

géo : Sud de l'Europe, Afrique du Nord

Armoise arborescente

Feuillage gris argenté très découpé, fortement aromatique, feuillage utilisé pour parfumer le thé, 1,25 à 1,50m, en tout sens. Floraison jaune peu intéressante à la fin du printemps. Talus, rocaille, massif. Plein soleil, très résistant à la sécheresse, -12°C.

code tarif E

Artemisia tridentata ssp.wyomingensis

famille : Asteraceae

milieu : pente rocheuse, colline entre 800 et 2000m d'alt

géo : USA, ouest

Buisson arrondi de 60 à 90 cm de hauteur gris argenté, persistant. Feuilles divisées en 3 lobes d'1 à 4 cm de longueur au pédoncule étroit qui se rattache à la branche. Petites fleurs jaune pâle en fin d'été. Plein soleil, sol caillouteux sec bien drainé, rocaille, jardin naturel, -15°C.

code tarif E

Atraphaxis virgata

famille : Polygonaceae

syn. *A. lanceolata* var. *virgata*

milieu : steppe, pentes des déserts rocailleux, entre 600 - 1000m alt

géo : Chine, Mongolie, Kazakhstan, Turkmenistan

Arbuste caduc 1,50 m en tout sens. Port aux branches dressées et arquées en tout sens. Petite feuille oblongue gris vert foncé. Petite fleur rose pourpré en fin d'été, automne. Fond de massif, rocaille, talus. Soleil, sol bien drainé. -15°C.

code tarif **F**

Berberis vulgaris

famille : Berberidaceae

milieu : coteaux calcaire, friche

géo : Europe, Turquie, Iran

Epine-vinette

Arbuste à feuillage caduc de 1,5 à 3m de hauteur, tiges très épineuses. Floraison jaune au printemps suivie de petits fruits rouges en automne. Feuille arrondie aux bords dentés se parant de magnifiques couleurs d'automne. Plein soleil, mi ombre très résistant à la sécheresse, - 20°C. Haie basse, haie vive, bosquet d'arbustes. 1/m2

code tarif **D**

Buddleja 'Lochinch'

famille : Buddlejaceae

milieu :

géo : horticole

Arbuste de 3m de hauteur x 2 m de largeur. Feuillage persistant, gris à revers duveteux, Fleurs bleu violacé parfumées en début et fin d'été. Plein soleil, haie, fond de massif, -15°C. 1/m2

code tarif **D**

Buddleja alternifolia

famille : Buddlejaceae

milieu : fourrés, lits de rivières asséchées entre 1500 et 4000m d'alt.

géo : Chine

Vigoureux arbuste au port retombant de 2 à 4 m en tout sens. Les branches sont arquées, fines, feuillage caduc. Floraison mauve le long des tiges souples, odorantes, en fin de printemps et début d'été. Plein soleil, sol argilo calcaire, - 20°C. 1/m2

code tarif **E**

Buddleja officinalis

famille : Buddlejaceae

milieu : forêt à la frange des montagnes, fourrés au bord des berges, entre 200 et 2800m d'alt.

géo : Chine

Arbre aux papillons

Arbuste de 3m de hauteur x 2m de largeur. Feuillage persistant gris vert à revers argenté. Fleurs mauve pâle à cœur jaune, parfumées en fin d'hiver et début de printemps. Haie libre, fond de massif, isolé. Plein soleil, résistant à la sécheresse, -12°C.

code tarif **E**

Buddleja x pikei 'Hever'

famille : Buddlejaceae

milieu : hybride de B.alternifolia x B.crispa

géo : Horticole

Arbuste d'1,50 à 2m en tout sens au port légèrement retombant. Feuille caduque, gris vert à revers duveteux. Fleur rose tendre en fin d'été. Soleil, mi-ombre, haie, fond de massif, -15°C.

code tarif **E**

Bupleurum fruticosum

famille : Apiaceae

milieu : fourrés, talus pierreux, parois rocheuses,

géo : Sud de la France, Espagne

Arbuste formant un buisson persistant d'1 à 1,50m en tout sens. feuillage vert soutenu lisse, parfumé lorsqu'on le froisse. Ombelle de fleurs jaune acide en été. Plein soleil, sol bien drainé, pauvre, très résistant au sec, grande rocaille, haie, talus, couvre sol. -15°C. 1/m2

code tarif **D**

Campylotropis macrocarpa

famille : Papilionaceae

milieu :

géo : Chine

Arbuste caduc aux tiges souples de 1,50 à 2 m. Jolies fleurs roses et blanches en fin d'été. Massif d'arbustes, haie libre et basse. soleil, -12°C à -15°C.

code tarif **G**

C **Carpentiera californica**



famille : Hydrangeaceae

milieu : oued, chaparral, forêt de chêne,

géo : Californie

L'Anémone en arbre. Arbuste de 2 à 3m en tout sens. Feuille vert lisse, persistante. Fleurs blanches au printemps rappelant les anémones. Ombre à mi-ombre. n'hésite un sol amendé et un apport d'eau en été. Bosquet d'arbuste, haie. - 10°C

code tarif **H**

Caryopteris incana

famille : Verbenaceae

milieu : pentes abruptes

géo : Chine

Arbuste de 1 à 2m en tout sens, feuillage vert à revers gris, découpé, caduc. Fleurs bleu soutenu en fin d'été. Haie libre, fond de massif. Plein soleil, sol sec, -15°C.

code tarif **E**

Ceanothus arboreus 'Trewithen blue'

famille : Rhamnaceae

milieu :

géo : Horticole

Arbuste persistant au port érigé de 3 à 8m de hauteur et 3 à 4m de largeur. Feuillage vert foncé, large et coriace. Floraison bleu soutenu, légèrement parfumée au printemps. Plein soleil, supporte le calcaire. Haie libre, isolé, -15°C. 1 /m2

code tarif **F**

Ceanothus divergens

famille : Rhamnaceae

milieu : bande cotière, chaparral de 00 à 500m d'alt

géo : Californie

Buisson prostré atteignant 1 à 1,50 m de hauteur. Les feuilles vert vernissé sont découpé rappelant une feuille de houe. Floraison printanière bleu lavande. Soleil, -12°C . Massif, haie basse, rocaille,

code tarif **F**

Ceanothus 'Concha'

famille : Rhamnaceae

milieu :

géo : horticole

hybride de C. impressus x C. papillosus
Arbuste persistant au port érigé de 2 à 3m de hauteur et de largeur. Feuillage vert foncé, étroit et coriace. Floraison bleu soutenu, légèrement parfumée au printemps. Plein soleil, supporte le calcaire. Haie libre, isolé, -15°C. 1 /m2

code tarif **F**

Ceanothus 'Skylark'

famille : Rhamnaceae

milieu :

géo : Horticole

hybride de C. thyrsiflorus var. thyrsiflorus x C. velutinus
Arbuste au feuillage vert soutenu, persistant formant un buisson en forme de dôme. Floraison bleu foncé en juin, plus tardive que le C. 'Concha'. Soleil, -12°C. Haie, bosquet d'arbuste.

code tarif **E**

Ceanothus 'Puget Blue'



famille : Rhamnaceae

milieu : Hybride entre C. impressus x C. papillosus var. roeanus

géo : Sélectionné au Washington Park Arboretum de Seattle

Arbuste buissonnant, compact, de 3 m en tout sens à +. Feuillage vert soutenu, persistant. Floraison d'un beau intense. Soleil .-12°C. Haie, Bosquet d'arbustes.

code tarif **E**

Cercis siliquastrum 'Alba'



famille : Caesalpiniaceae

milieu : Bois et côtes sec

géo : Bassin méditerranéen, Asie mineure

Arbuste ou petit arbre de 4 à 6m. Feuille vert glauque, caduque, en forme de cœur. Fleurs cauliflores blanches au printemps. Soleil, mi-ombre, - 15°C. Isolé, bosquet d'arbuste, haie.

code tarif **F**

Chamaebatiaria millefolium

famille : Rosaceae

milieu : Chaparral

géo : ouest des USA

Arbuste d'1 m de hauteur et 50 cm de largeur, feuillage persistant très découpé comme de la dentelle. Lumineuses fleurs blanches en panicules dressées pendant l'été. Plein soleil, sol sec bien drainé, massif, rocaille, -20°C. 2/m2

code tarif **G**

Choisya 'Aztec Pearl'

famille : Rutaceae

milieu :

géo : Horticole

hybride de C.arizonica x C.ternata

Arbuste de 1 m de hauteur x 50 cm de largeur, feuilles très légères aux folioles linéaires, persistantes. Feuilles parfumées lorsqu'elles sont froissées. Floraison blanche parfumée en mars avril, remonte parfois à l'automne. Soleil ou mi-ombre. Haie basse, massif, -15°C. 3/m2

code tarif **E**

Chilopsis linearis

famille : Bignoniaceae

milieu : près des cours d'eau dans le désert du Mojave

géo : Colorado, désert de Mojave

Saule du désert- Arbuste à feuillage caduc de 3 à 5 m de hauteur 3 à 4 m de largeur. Feuilles vertes linéaires. Floraison rose parfumée en été. plein soleil. Nécessite un suivi d'arrosage les premiers été. Haies, Isolé. Sol argileux, sablonneux, alcalin il supporte une inondation momentanée. -15°C

code tarif **F**

Cistus albidus

famille : Cistaceae

milieu : garrigue

géo : Sud de l'Europe, Afrique du Nord

Ciste cotonneux

Arbuste persistant de 1m de hauteur par 80 cm de largeur, feuillage gris duveteux. Fleurs roses d'avril à mai. Plein soleil pour une abondante floraison mais supporte parfaitement l'ombre ou la mi-ombre, sol calcaire, bien drainé. Rocaille, jardin naturel ; - 15°C. 1 à 3/m2

code tarif **D**

Cistus atriplicifolium

famille : Cistaceae

syn. : *Halimium atriplicifolium*

milieu : fourrés arbustifs, rocailles

géo : Espagne, Maroc

Arbuste de 1 à 1,20m en tout sens, gris argenté, persistant. Grandes fleurs jaune d'or au printemps et en été. Nécessite un sol très bien drainé, calcaire. Soleil ou mi-ombre, rocaille, jardin naturel, haie, -12°C, -15°C. 1 à 3/m2

code tarif **F**

Cistus clusii

famille : Cistaceae

syn. : *C.rosmarinifolia*

milieu : zones incultes, graveleux, fourrés broussailles

géo : Espagne

Buisson de 1m de hauteur par 50 cm de largeur. Port dressé. Feuilles vert foncé, linéaires. La plante ressemble au romarin. Multitude de petites fleurs blanches au printemps. Sol calcaire, soleil mi-ombre, rocaille, jardin naturel, massif, -15°C. 3/m2

code tarif **E**

Cistus clusii var.multiflorus

famille : Cistaceae

milieu : Matorral, garrigue rocailleuse et calcaire

géo : Espagne, Baléares

Buisson de 0,80 à 1 m de hauteur par 50 à 80 cm de largeur. Port dressé. Feuillage vert foncé, linéaires. Multitude de petites fleurs blanches en inflorescence serrée au printemps. Sol calcaire, soleil, mi-ombre, rocaille, jardin naturel, massif, -15°C. 3/m2

code tarif **E**

Cistus creticus

famille : Cistaceae

milieu : Maquis et coteaux arides

géo : Méditerranée,

Ciste de Crête. Buisson persistant, feuillage gris vert légèrement crispé, jeune tige collante. Fleurs aux pétales froissées rose violacé au printemps. Sol calcaire, plein soleil, mi-ombre. Rocaille, jardin naturel, -15°C. 1/m2

code tarif **E**

C



Cistus laurifolius

famille : Cistaceae

milieu : taillis, bois clairs

géo : Europe méditerranéenne

Ciste à feuille de laurier. Buisson dense, persistant, de 1 à 1,50m. Grandes feuilles larges, épaisses, vert très soutenu au revers blanchâtre, odorantes. Fleur blanche, large de 5 à 6 cm regroupées par 3 à +. Soleil, mi-ombre, -15°C.

code tarif E

Cistus libanotis

famille : Cistaceae

milieu : se rencontre dans les zones sableuses, les dunes les pinèdes proche de la mer

géo : Sud ouest de l'Espagne, Portugal

Buisson au port prostré ou diffus, rarement érigé. L'écorce des tiges est foncé, visqueux. Les feuilles sont linéaires vert profond. Floraison blanche avec des taches jaune à la base en mai juin, pointe du bouton florale pourpre. Sol bien drainé. Plein soleil ombre légère, -12°C. 1/m2

code tarif E

Cistus monspeliensis

famille : Cistaceae

milieu : garrigue

géo : Afrique du Nord, Espagne, Italie, France

Buisson de 0,80 à 1m en tout sens, feuilles vert foncé, allongées et collantes. Fleurs blanche en mai, juin. Sol calcaire, soleil ombre légère. -12°C. 1/m2

code tarif D

Cistus salviifolius

famille : Cistaceae

milieu : garrigue

géo : pourtour méditerranéenne

Buisson d'1m en tout sens, au port en boule étalée. Feuillage gris vert, légèrement rugueux. Floraison blanche en avril mai. Sol bien drainé. Plein soleil ombre légère, -15°C. 1/m2

code tarif D



C

Cistus x 'Ann Baker

famille : Cistaceae

syn. : hybride de C.x dansereaui 'Decumbens' x

géo :

Buisson persistant d'0,80 à 1 m de hauteur. Longue feuille vert soutenu, rugueuse, persistante. Fleur blanche à macule pourpre au printemps. Soleil, -12°C, Jardin naturel, massif, talus, haie basse.

code tarif E

Cistus x aguilari f immaculatus



famille : Cistaceae

syn. : hybride de C.ladanifer x C.populifolius.

géo :

Arbuste pouvant atteindre 2m, feuillage persistant, vert soutenu à bord ondulé. Jeunes pousses collantes et odorantes. Grandes fleurs blanches en mai. Soleil, sol neutre, jardin naturel, -15°C. 1/m2

code tarif E

Cistus x argenteus 'Peggy Sammons'

famille : Cistaceae

milieu :

géo : Horticole

hybride de C.x canescens x C.laurifolius

Arbuste au feuillage gris vert, persistant formant un buisson d'1m en tout sens. Grandes fleurs rose tendre au printemps. Sol calcaire. Plein soleil mi-ombre, massif, haie basse, jardin naturel. -15°C. 1/m2

code tarif D

Cistus x canescens 'Albus'

famille : Cistaceae

milieu :

géo : Horticole

hybride de C.albidus x C.creticus

Buisson formant une boule dense de 1 m par 1 m environ. Feuillage gris vert, persistant. Grandes fleurs blancs pures. Soleil, -12°C. jardin naturel, haie basse.

code tarif D

C Cistus x crispatus

famille : Cistaceae

syn. : hybride de *C.creticus* x *C.crispus*

géo : Afrique du Nord

Buisson persistant, étalé, de 0,60 de hauteur par 1m de large. Feuille gris-vert au bord ondulé, rugueuse. Floraison rose fuschia au printemps. Soleil, mi-ombre. Massif, talus, jardin naturel. -12°C.

code tarif E

Cistus x corbariensis

famille : Cistaceae

milieu :

géo : Horticole

hybride de *C.populifolius* var *populifolius* x *C.salviifolius*
Arbuste persistant de 0,60 à 0,80m de hauteur x 1 à 1,20m de largeur, feuillage vert sombre à pourpre en hiver. Floraison blanche en avril/mai. Sol calcaire. Plein soleil ou mi-ombre. Excellent couvre-sol, massif, -15°C. 1/m2

code tarif D

Cistus x cyprius

famille : Cistaceae

milieu :

géo : horticole

hybride de *C.ladanifer* x *C.laurifolius*
Arbuste pouvant atteindre 1,50 à 2 m. Feuillage persistant, vert soutenu épais et légèrement coriace. Jeunes pousses collantes et odorantes. Grandes fleurs blanches en mai, juin. Soleil, sol neutre, jardin naturel, -15°C. 1/m2

code tarif E

Cistus x dansereau 'Portmeirion'

famille : Cistaceae

milieu :

géo : horticole

hybride de *C.ladanifer* x *C.inflatus*
Buisson assez haut pouvant atteindre 1 à 1,20m. Grande fleur blanche au printemps. Soleil, -12°C. Jardin naturel, massif

code tarif E

Cistus x dubius

famille : Cistaceae

syn. : Hybride de *C.laurifolius* x *C.salviifolius*.

géo :

Buisson persistant au feuilles larges, coriaces, vert foncé, d'1 à 1,50m en tout sens. Fleurs blanc pure, de 6 cm environ. Soleil, mi-ombre. Jardin naturel, haie basse, massif. -12°C

code tarif E

Cistus x florentinus 'Bézier'

famille : Cistaceae

milieu :

géo :

hybride *C.monspeliensis* x *C.salviifolius*
Buisson au feuillage vert sombre d'1m en tout sens. Les fleurs sont blanc pur avec un coeur jaune particulièrement vif. Soleil, mi-ombre, -15°C. Couvre sol, jardin naturel, massif.

code tarif D

Cistus x florentinus 'Tramontane'

famille : Cistaceae

milieu :

géo :

hybride de *C.monspeliensis* x *C.salviifolius* 'Prostratus'
Arbuste au port prostré de 20 à 30cm de hauteur par 50 à 70 cm de largeur. Feuillage vert foncé, fin et persistant. Floraison blanc pur au printemps. Sol calcaire, plein soleil, rocaille, jardin naturel, bordure, -15°C. 2 à 3/m2

code tarif D

Cistus x ledon

famille : Cistaceae

milieu : hybride de *C.laurifolius* x *C.monspeliensis*

géo :

Buisson compact et arrondis de 0,80 à 1m en tous sens. Feuilles persistantes, vert sombre, allongées et étroites, jeunes tiges collantes. Nombreuse petites fleurs blanc pur au printemps. Soleil, mi-ombre. Rocaille, talus, massif, jardin naturel. -15°C.

code tarif E

C **Cistus x lenis 'Grayswood Pink'**

famille : Cistaceae

milieu :

géo : Horticole

hybride de *C.sintenisii* x *C.parviflorus*
Coussin étalé de 20 à 30 cm de hauteur par 0,90 à 1 m de largeur. Feuillage gris vert à gris, persistant. Floraison rose tendre au printemps. Sol calcaire, plein soleil, rocaille, jardin naturel, couvre sol, massif -15°C. 2/m2

code tarif **D**

Cistus x mesoensis

famille : Cistaceae

milieu :

géo : Horticole

hybride de *C. 'Grayswood Pink'* x *C.monspelienis*
Buisson de feuille dense, gris vert, couvrant le sol. Fleur moyenne blanche aux pétales lavés de rose tendre.

code tarif **D**

Cistus x nigricans

famille : Cistaceae

syn. : hybride de *C.populifolius* x *C.monspelienis*

géo :

Buisson persistant d'0,80 à 1,20 m en tous sens. Feuilles vert sombre, allongées, jeunes tiges collantes et odorantes. Floraison blanche en avril, mai. Plein soleil, mi-ombre légère. Talus, jardin naturel, petite haie, massif. -12°C.

code tarif **E**

Cistus x oblongifolius

famille : Cistaceae

milieu :

géo : Espagne, Portugal

hybride de *C.laurifolius* x *C.inflatus*
Buisson de 80 cm en tout sens, au feuillage large, vert profond, métallique. Floraison blanche en mai juin, jeune pousse collante. Sol bien drainé. Plein soleil ombre légère, -12°C. 1/m2

code tarif **D**

Cistus x pagei

famille : Cistaceae

milieu : *C. parviflorus* x *C. laurifolius*

géo :

Buisson compact de 50 à 80 cm en tout sens. Feuilles gris-vert foncé au revers plus clair, persistantes, odorantes. Floraison en avril mai de fleurs rose poudré. Sol calcaire, soleil, grande rocaille, jardin naturel, talus. -15°C.

code tarif **E**

Cistus x paucanthus

famille : Cistaceae

'Natacha'

syn. : hybride de *C.parviflorus* x *C.salviifolius*

géo :

Buisson en forme de dôme de 0,30 à 0,50 m de hauteur par 0,80 à 1 m de largeur. Petite feuille vert foncé, persistant. Floraison rose pâle au printemps. Sol bien drainé, plein soleil, mi-ombre. Rocaille, jardin naturel, bordure, jardin de gravier. -10°C.

code tarif **D**

Cistus x pulverulentus

famille : Cistaceae

milieu :

géo :

hybride de *C.albidus* x *C.crispus*
Arbuste au port large de 40 à 50 cm de hauteur par 1 m à + de largeur, feuillage gris vert persistant légèrement gaufré. Floraison en fin de printemps, début d'été de fleurs rose soutenu. Sol calcaire. Plein soleil. Rocaille, jardin naturel, massif. -15°C. 1 /m2

code tarif **D**

Cistus x purpureus

famille : Cistaceae

milieu :

géo : horticole

hybride de *C.creticus* x *C.ladanifer*
Arbuste de 1 à 1,20m, feuilles longues, vert foncé, persistantes, odorantes. Floraison en avril mai de fleurs rose soutenu à macule brune au centre des pétales. Sol calcaire. Plein soleil, grande rocaille, jardin naturel, haie basse. -15°C. 1 /m2

code tarif **D**

C **Cistus x purpureus 'Alan Fradd'**

famille : Cistaceae

milieu :

géo : Horticole

Arbuste de 1,20 à 1,50m en tout sens, feuillage vert mat, odorant, persistant. Grandes fleurs blanches à macule brun pourpre au printemps. Sol calcaire. Plein soleil mi-ombre, sol sec et drainé, grande rocaille, jardin naturel, haie basse, -15°C. 1 /m2

code tarif **D**

Cistus x skanbergii

famille : Cistaceae

milieu :

géo : Sud Italie, Sicile

hybride naturel entre C. parviflorus x C. monspeliensis
Arbuste de 80 cm à 1m en tout sens, au port étalé. Feuillage étroit gris vert, légèrement odorant, persistant. Floraison rose saumon assez pâle en avril mai. Sol calcaire. Plein soleil, terrain sec et drainé, rocaille, jardin naturel, massif, -15°C. 1 à 2 /m2

code tarif **D**

Cistus x ultraviolaceus

famille : Cistaceae

milieu :

géo : Horticole

hybride de C. heterophyllus x C. crispus
Buisson bas et trapus de 50 cm en tout sens. Feuillage vert, persistant. Floraison rose violacé au printemps. Soleil -10°C, -12°C. Jardin naturel, massif.

code tarif **D**

Cistus x verguinii f. maculatus

famille : Cistaceae

milieu :

géo : Horticole

Arbuste compact de 50 cm à 1m en tout sens, feuillage vert foncé, odorant, persistant. Jeunes pousses collantes. Grandes fleurs blanches à macule brun pourpre au printemps. Sol calcaire. Plein soleil mi-ombre, sol sec et drainé, grande rocaille, jardin naturel, haie basse, talus, -15°C. 1 /m2

code tarif **D**

Colletia spinosa

famille : Rhamnaceae

milieu : Vallée intérieur, lisière de bois.

géo : Brésil, Uruguay

Arbuste formant un buisson déstructuré, persistant, de 2 à 3 m de hauteur par 1,50 m de largeur. Le feuillage est coriace et épineux, vert. La fleur est blanc rosé, parfumée, au printemps. Soleil, -15°C.

code tarif **F**

Colutea arborescens

famille : Papilionaceae

milieu : bois clair

géo : Afrique du Nord, Sud de l'Europe

Baguenaudier

Arbuste caduc aux tiges dressées, raide de 1,50 à 2m. Floraison jaune en mai juin, suivie de fruits formés par une gousse gonflée étonnante. Soleil ou mi ombre. -15°C. 1/m2

code tarif **E**

Colutea orientalis

famille : Papilionaceae

syn. : *Colutea cruenta*

milieu : broussailles sur sol calcaire

géo : Iran, Arménie, Azerbaïdjan, Ukraine

Arbuste caduc de 2m de hauteur, 1,50m de largeur, au port dressé et rigide. Petites feuilles vert glauque. Floraison orangée et pourpre en mai juin. Soleil ombre légère. -20°C.

code tarif **F**

Coronilla glauca

famille : Papilionaceae

milieu : bois, côteaux, pelouse calcaire

géo : Bassin méditerranéen

Coronille glauque

Arbuste au feuillage persistant de 1m de hauteur par 80 cm de largeur, feuille vert glauque, lisse, épaisse. Fleur jaune franc, parfumée de février à mars. Ombre, mi-ombre ou soleil. Bonne plante pour les ombres sèches. -15°C.

code tarif **D**

C **Coronilla glauca f.citrina**

famille : **Fabaceae**

milieu : bois, côteaux, garrigue

géo : Bassin méditerranéen,

Forme identique à *Coronilla glauca* mais à la couleur de floraison jaune citron.

code tarif **E**

Coronilla juncea

famille : **Papilionaceae**

milieu : garrigue

géo : Espagne, Italie, Croatie, Albanie, France

Coronille à feuille de jonc

Arbuste de 50 cm à 1 m au port gracile. Les tiges rappellent celle du jonc et sont dressées, les feuilles sont très petites voir absentes, glauques et charnues. Floraison jaune au printemps suivie de petites gousses. Soleil, sol rocailleux, rocaille, jardin naturel, -15°C. 2 /m2

code tarif **E**

Cotinus coggygia

famille : **Anacardiaceae**

syn. : *Rhus cotinus*

milieu : éboulis, rocaille, falaise, garrigue,

fourré arbustif

géo : bassin méditerranéen

Arbre à perruques

Grand arbuste de 1 à 4 m de hauteur par 1,50 à 3 m de largeur. Feuillage vert au printemps virant au rouge pourpre vif en automne, caduc. Inflorescences ressemblant à des touffes plumeuses aux reflets rosés. Haie vive, massif d'arbustes, isolé, grande rocaille. - 15°C. 1 /m2

code tarif **E**

Cotinus coggygia 'Royal Purple'

famille : **Anacardiaceae**

milieu :

géo : Horticole

Proche de l'espèce type mais au feuillage pourpre foncé virant légèrement à l'orangé en automne, caduc. Inflorescence plumeuse aux reflets rosés. Haie vive, massif d'arbuste, isolé. - 15°C.

code tarif **E**

Cotinus 'Grace'

famille : **Anacardiaceae**

milieu : obtenue aux Pépinières Hillier, Angleterre, par Peter Dummer

géo : Horticole

Grand arbuste de 2 à 4 m de hauteur par 1,50 à 3 m de largeur. Grande feuille ovale, caduque, vert pourpré au printemps virant au rouge pourpré très lumineux en automne. Inflorescence ressemblant à des touffes plumeuses rose pourpre au printemps. Haie vive, massif d'arbustes, isolé, grande rocaille. Soleil, mi-ombre - 15°C.

code tarif **E**

Cotinus obovatus

famille : **Anacardiaceae**

milieu : falaises rocheuses, clairières calcaires

géo : Sud-est des USA

Arbuste caduc de 4 à 6 m de hauteur par 3 à 4 m de largeur. Grandes feuilles ovales, se teintant de tons flamboyants à l'automne. Floraison plumeuse beige rosé à la fin du printemps. Plein soleil, ombre légère. - 20°C

code tarif **F**

Cotoneaster buxifolius var rockii

famille : **Rosaceae**

syn. : *Cotoneaster rockii*

milieu : pente rocailleuse, bord de route - 1000 à 3900 m d'alt.

géo : Chine Himalya

Petit arbuste persistant, au port prostré de 50 cm à 1 m de hauteur. La feuille est petite ronde, coriace légèrement duveteuse sur le dessous. Les branches sont de coloris gris brun à rouge noir. Les petites fleurs simples, blanc rosé apparaissent en mai juin et sont suivi de fruit rouge à l'automne. Soleil, mi-ombre, -12°C. Talus, rocaille, massif d'arbustes.

code tarif **G**

Cowania mexicana

famille : Rosaceae

milieu : pentes sèches et rocailleuses, chaparral

géo : Californie, Colorado, centre du Mexique

Petit arbuste d'environ 1 à 2m en tout sens, feuillage très découpé vert foncé moucheté de points blancs, collant et parfumé. Floraison blanche ressemblant à un petit églantier en été, suivie de fruits plumeux, très décoratifs. Plein soleil, sol sec bien drainé, rocaille, massif, -15°C.

code tarif F

Crataegus azerolus

famille : Rosaceae

milieu : haie, bord de champ

géo : Bassin méditerranéen occidentale

Arbuste caduc au port dense de 1 à 6m de hauteur portant de très grosses épines. Feuille oblongue, découpée en trois à cinq lobes, verte au revers glabre. Fleur blanc rosé au printemps suivie de fruit rouge orangé à la saveur de la pomme. Soleil, mi-ombre. Haie, bosquet d'arbustes. -15°C.

code tarif E

Cytisus battandieri

famille : Papilionaceae

syn. : *Argyrocyttis battandieri*

milieu : montagnes du Moyen- Atlas de 1800 à 2000m d'alt.

géo : Maroc

Genêt ananas

Arbuste de 3 à 4 m de hauteur, feuilles duveteuses, gris vert aux reflets argentées. Arbuste semi-persistant. Floraison jaune en forme de petit ananas, très parfumée en juin. Plein soleil, sol drainé, -15°C.

code tarif G

Dalea bicolor var argyreae

famille : Fabaceae

milieu : plateau calcaire,

géo : Texas, Nouveau Mexique

Petit arbrisseau au port étalé de 40 à 90 cm en tout sens. Les feuilles sont petites, grises, tomenteuses, persistante. Fleur de pois rose magenta à l'automne. Soleil, sol bien drainé. Rocaillie, massif, jardin de gravier. -10°C.

code tarif G

Dalea pulchra

famille : Fabaceae

milieu : Pente gravelleuse, rocaillie - 600 à 1500m d'alt

géo : Arizona, Nouveau Mexique

Petit buisson étalé d'1,20 à 1,50m en tout sens. Les feuilles sont petites gris vert tomenteux, persistante. Fleur de pois rose magenta au printemps. Soleil, mi-ombre, sol bien drainé. Rocaillie, massif, jardin de gravier. -10°C.

code tarif G

Ebenus creticus

famille : Fabaceae

milieu : pente sèche, talus rocaillieux, falaise, de 0 à 500m d'alt.

géo : Crète

Coussin buissonnant de 50 cm en tout sens. Feuillage gris argenté, duveteux. Floraison d'épis ovoïdes soyeux aux coloris rose pourpré. Soleil, sol drainant et rocaillieux. -12°C. Rocaillie, bord de muret, jardin naturel.

code tarif F

Elsholtzia stauntonii

famille : Lamiaceae

milieu : colline herbeuse, montagne rocheuse - 700 à 1600m d'alt.

géo : Chine

Menthe en arbre - Arbuste caduc de 80 cm à 1m en tout sens au feuillage aromatique. Floraison rose violacé en épis denses de septembre octobre. Sol amendé, soleil, mi-ombre - Massif de vivace, jardin de gravier. - 15°C.

code tarif D

Ephedra aphylla

famille : Ephedraceae

milieu : steppe arbustive, garrigue, désert,

géo : Israël, Liban

Buisson très ramifié, au port déstructuré et graphique de 1 à 1,50m en tout sens. Tige composé de sections facilement désarticulées, feuilles très réduites voir inexistantes. Floraison jaune clair suivi de fruit rouge vif, décoratifs. Haie vive, massif d'arbuste, isolé, rocaillie. Soleil, - 15°C.

code tarif E

Erica manipuliflora



famille : **Ericaceae**

milieu : Phrygana, rocaïlle – de 0 à 2000m d'alt

géo : Balkans, Grèce, Crète

Sous arbrisseau aux tiges dressées de 50 à 80 cm en tout sens. Feuilles linéaires et épaisses en forme d'aiguillons. Floraison rose en grappes compactes à la fin de l'été et en automne. Soleil, mi-ombre légère, sol bien drainé, jardin naturel, rocaïlle. -15°C.

code tarif **F**

Erica multiflora

famille : **Ericaceae**

milieu : bois, coteaux sec, garrigue

géo : Afrique du Nord, Dalmatie, Espagne, Italie, France

Sous arbrisseau de 0,40 à 1,50 m de haut et de largeur aux tiges dressées. Feuilles linéaires et épaisses en forme d'aiguillons, prenant une coloration plus ou moins marron pourpre en hiver. Floraison rose en grappes compactes de novembre à mars. Soleil, mi-ombre légère, sol sec bien drainé, jardin naturel, rocaïlle. -15°C.

code tarif **E**

Euryops tysonii

famille : **Asteraceae**

milieu : broussailles, prairies, bords de chemin des montagnes du Drakensberg,

géo : Afrique du sud

Petit buisson persistant au port très architecturé, de 50 à 70 cm. Feuilles ovales, vert tendre, un peu succulente. Petites fleurs jaunes à l'extrémité des rameaux au printemps et remontant parfois à la fin d'été, début de l'automne. Plein soleil, massif associé aux vivaces, - 15°C. 3 /m2

code tarif **E**

Exochorda racemosa

famille : **Rosaceae**

milieu :

géo : Nord de la Chine

Arbuste de 2,50m en tout sens aux branches grêles. Feuilles longues, fines, vert tendre, caduques. Nombreuses fleurs simples blanches apparaissant au bout des branches au printemps, parfumées. Soleil mi ombre. Massif d'arbuste, haie libre. -15°C.

code tarif **E**

Fabiana imbricata f. violacea

famille : **Solanaceae**

milieu : Pente sèche d'altitude.

géo : Chili, Argentine

Buisson persistant de 1 à 3m de hauteur par 1 à 2m de large. Les feuilles vertes sont petites, imbriquées et font penser à de la bruyère. Les fleurs sont tubulaire , violettes, le long des rameaux. Floraison en fin de printemps début d'été. Soleil, sol argilo-calcaire, -12°C. Haie, bosquet d'arbustes.

code tarif **E**

Fontanesia phillyreoïdes



famille : **Oleaceae**

milieu : Fourrés et haies

géo : Turquie, Syrie, Liban, Sicile, Malte

Arbuste caduc de 2 à 3m de hauteur. Les feuilles sont simples, ovales et opposées. Les panicules de fleurs blanches, mellifères, apparaissent au printemps et sont suivi de samares. Soleil, mi-ombre, haie, bosquet d'arbustes, isolé. - 12°C

code tarif **F**

Fremontodendron 'California Glory'

famille : **Sterculiaceae**

milieu : chaparral

géo : ouest des USA

Arbuste de 3 à 4 m de hauteur, feuillage persistant, découpé, lobé (ferait penser au feuillage du figuier). Grande fleur jaune vif s'ouvrant au début du printemps. Plein soleil, isolé, palissé le long d'un mur, -15°C. 1 /m2

code tarif **F**

Genista hispanica

famille : **Papilionaceae**

milieu : lieux aux sols chauds et secs, garrigue, chênaie pubescente dégradée.

géo : Sud des Alpes, Espagne

Coussin épineux de 40 à 60 cm en tout sens. Petites feuilles vert foncé, caduc en hiver . Reste très présent en hiver par la densité importante de tiges formant le coussin. Fleur jaune d'or en avril mai recouvrant totalement le coussin. Jardin naturel, massif, rocaïlle. Soleil, -15°C. 1 à 3 /m2

code tarif **D**

Genista lydia

famille : Papillonaceae

milieu : bois ouvert, maquis de 0 à 2100m d'alt

géo : Bassin méditerranéen, Turquie

Genêt de Lydie Arbuste à port prostré de 80 cm de large par 30 à 40 cm de haut. Feuilles linéaires très petites, caduques, voir inexistante Floraison de grappe jaune. La plante se transforme en un tapis jaune d'or d'avril à juin. Soleil, mi-ombre légère, rocaille, bord de muret, -15°C.

code tarif E

Genista umbellata

famille : Papillonaceae

milieu : pentes rocailleuses,

géo : Espagne (sud et sud est) et Afrique du Nord

Arbuste au port en boule de 0,40 à 1,20m de diamètre. Tiges dressées, très peu feuillées. Feuillage linéaire vert soutenu à la base des rameaux. Les fleurs duveteuses, jaunes, se développent aux extrémités des tiges en juin. Soleil, sol rocailleux. Rocaille, jardin naturel, -15°C

code tarif E

Grevillea juniperina

famille : Proteaceae

milieu :

géo : Nouvelle-Galles du sud, Australie

Arbuste au port érigé de 1 à 2m par 1m de diamètre. Feuillage linéaire vert soutenu rappelant des feuilles de genévrier. Les fleurs, rouge vif se développent aux extrémités des tiges en fin d'hiver début de printemps. Soleil, sol bien drainé, haie, jardin naturel, -15°C.

code tarif E

Hertia cheirifolia

famille : Asteraceae

syn. : *Othonopsis cheirifoli*

milieu : Steppes, friches, bord de culture

géo : Afrique du Nord

Arbuste de 20 à 30 cm de hauteur par 1 à 1,50 m de diamètre. feuilles persistant gris bleuté, charnues. Port rampant ou retombant en bord de muret. Floraison de marguerite jaune citron de février à mai. Plein soleil. massif, rocaille, jardin de gravier. -15°C. 1 /m

code tarif D

Heteromeles arbutifolia

famille : Rosaceae

milieu : chaparral

géo : Californie

Gros arbuste ou petit arbre de 5 à 10 m de hauteur, ressemblant à un arbousier. Grande feuille vert sombre, coriace, ovale, persistante, denté sur les bords. Panicules de fleurs blanches en début d'été, suivies de baies rouge orangé en automne et une partie de l'hiver. Croissance rapide. Sol peu calcaire et sec, plein soleil, haie, isolé, -12°C.

code tarif F

Hypericum balearicum

famille : Clusiaceae

syn. : *Ascyrum glandulosum*

milieu : garrigue, rocailles, plateaux calcaires

géo : Majorques, Balears

Feuilles vert foncé aux bords ondulés, collantes et aromatiques. Floraison jaune doré au printemps qui peut remonter une partie de l'été et de l'automne. Soleil, sol argilo calcaire. -15°C. Jardin naturel, talus, massif, rocaille

code tarif E

Indigodera gerardiana

famille : Fabaceae

milieu : pentes boisées - 0 à 2300m d'alt.

géo : Himalaya

Indigo de l'Himalaya - Petit arbuste aux feuilles rondes, vert clair, caduques. Tiges souples mais dressées de 1m à 2m de hauteur. Floraison rose tout l'été. Plein soleil, résistant à la sécheresse, - 15°C.

code tarif E

Jasminum fruticans

famille : Oleaceae

milieu : Côteaux secs et rocailleux, garrigue

géo : Bassin méditerranéen, Asie mineure, Afrique du Nord

Arbrisseau d'1 m de hauteur au port dressé, 0,50 à 1 m de diamètre, persistant. Feuilles vert foncé brillantes, tiges vertes. Fleurs jaunes à l'extrémité des rameaux au printemps suivies de fruits noirs. Rocaille, massif. Plein soleil, - 15°C. 3 /m2

code tarif D

Jasminum parkeri



famille : **Oleaceae**

milieu : rocaille, crevasse rocheuse, bord de route

géo : Sud-ouest de l'Himalaya

Jasmin de très petite taille formant un coussin de 40 à 50 cm en tous sens, feuillage vert foncé persistant. Petites fleurs jaunes au printemps. Soleil ou mi-ombre, rocaille, massif, jardin de coussin, jardin de gravier -15°C.

code tarif

Jasminum mesnyi

famille : **Oleaceae**

syn. : *Jasminum primulinum*

milieu : Bois, ravins, entre 500 et 2600m d'alt.

géo : Chine

Grand arbuste de 3 à 5 m en tout sens, feuillage persistant vert foncé, tiges souples retombant en bord de muret. Fleurs jaunes, simples ou semi-doubles de mars à avril. Plein soleil, supporte la sécheresse mais préfère un sol pas trop aride, -12°C.

code tarif **D**

Jasminum officinalis

famille : **Oleaceae**

milieu : Subspontané dans les haies, les bois, les ravins, les lieux secs de 1800 à 4000m d'alt.

géo : Caucase, Iran, Chine

Jasmin blanc

Tiges grimpantes souples de 5 à 8 m de longueur, feuillage caduc. Fleurs blanches, parfumées en juin remontant parfois en été. À palisser ou en massif d'arbustes, bord de muret, pot. Plein soleil. -15°C.

code tarif **D**

Juniperus deppeana



famille : **Cupressaceae**

milieu : associé dans les forêts de pins et chênes

géo : Ouest USA, Mexique

Genévrier alligator. Petit conifère de 10 à 12m à l'écorce rugueuse et structuré rappelant le dos d'un alligator. Feuillage gris bleuté, persistant. Fruit brun rouge, glauque. Isolé, haie, bosquet. -12°C.

code tarif **G**

Juniperus sabina

famille : **Cupressaceae**

milieu : rochers et pelouses de montagne

géo : Europe centrale, Europe du Sud, Caucase

Sabinier

Arbuste de 1 à 4 m de diamètre, 0,50 à 0,70 de hauteur, touffu, aux tiges rampantes redressées à leurs extrémités. Petites feuilles piquantes vert sombre à l'odeur forte de résine. Floraison printanière suivie de fruit globuleux noir bleuâtre à l'automne. Grande rocaille, massif, talus. Plein soleil, - 15°C

code tarif **E**

Kolkwitzia amabilis 'Pink Cloud'

famille : **Caprifoliaceae**

milieu : pente de montagne, bord de route, de 300 à 1300m d'alt. 'Pink Cloud' a été obtenu à Wisley

géo : Chine

Petite arbuste de 2 à 3m au feuillage vert, caduc. Les branches arquées portent de nombreux bouquets de fleurs roses au cœur jaune au printemps. Soleil, mi-ombre. Massif d'arbustes, haie vive. - 15°C.

code tarif **E**

Lavatera olbia

famille : **Malvaceae**

syn. : *Malva olbia*

milieu : Lieux incultes et secs, friches

géo : Afrique du Nord, Sud de l'Europe

Lavatière d'Hyères

Arbuste au feuillage vert glauque semi-persistant d'une hauteur pouvant atteindre 2 m de hauteur et 1 m de largeur. Fleurs rose vif de mai à juillet. Soleil, mi-ombre. Massif d'arbustes, fond de massif de vivaces, -12°C.

code tarif **D**

Lespedeza thunbergii

famille : **Papilionaceae**

milieu : Lisière de forêt, bord de route, fourrés versants de montagnes .

géo : Chine

Arbuste à feuilles et tiges caduques d'1,50 à 2 m en tout sens. La plante repart du sol tout les printemps, il est nécessaire de tailler les tiges sèches. Fleurs rose pourpre d'août à octobre sur des tiges arquées retombantes. Plein soleil ou mi-ombre. Bord de muret, pot. - 25°C.

code tarif **E**

Leucophyllum frutescens

famille : **Scrophulariaceae**

milieu : pentes calcaires et rocheuses dans le désert de Chihuahua

géo : Texas, Nouveau Mexique

Arbuste de 1 à 1,50 m de hauteur par 1m de largeur au feuillage semi persistant gris argenté. Floraison rose vif en fin d'été, automne après les premières pluies. Soleil, sol bien drainé et caillouteux, haie libre, massif, res-tanque, -12°C.

code tarif **E**

Ligustrum vulgare

famille : **Oleaceae**

milieu :

géo : bassin méditerranéen

Oleaceae - Bassin méditerranéen

Arbuste de 2 à 3 m de hauteur. Feuillage vert sombre qua-siment persistant rougissant avec le froid. Petites fleurs blanches, odorantes en fin de printemps, suivi de baies noires en automne. Soleil ou ombre. Massif d'arbuste, haie libre. -15°C.

code tarif **D**

Lonicera x notha

famille : **Caprifoliaceae**

milieu :

géo : Est des USA

hybride de *L.ruprechtiana* x *L.tatarica*

Arbuste au feuillage vert, caduc, de 1,50 à 2 m en tout sens. Floraison blanche au printemps, parfumée. Soleil ou ombre légère. Massif d'arbustes, haie fleurie, isolée. -15°C.

code tarif **E**

Lonicera biflora

famille : **Caprifoliaceae**

milieu : forêt, bosquets entre 0 et 800m d'alt.

géo : Espagne et Afrique du Nord

Arbuste persistant au feuillage vert tendre, de 2 à 2,50 m en tout sens. Feuille opposée, légèrement glabre, ovale. Floraison blanche en fin d'été et automne. Soleil, tout sol, jardin naturel, haie libre... -15°C.

code tarif **E**

Lonicera etrusca

famille : **Caprifoliaceae**

milieu : côteau aride, haie, bois

géo : Europe méridionale, Sud de la France

Arbuste de 1 à 2 m en tout sens. Feuillage caduc. Les feuilles vertes sont poilues. La floraison blanc rougeâtre avec un peu de jaune est parfumée. Plein soleil ou d'ombre légère. Rocaille, massif d'arbustes, haie libre. -20°C

code tarif **E**

Lonicera fragrantissima

famille : **Caprifoliaceae**

milieu : Forêts, broussailles, 100 à 2700m d'alt.

géo : Chine

Buisson de 2 m en tout sens, tiges dressées raides. Feuillage caduc, vert sombre. Petites fleurs blanc crème en hiver, très parfumées. Massif d'arbustes, haie libre, isolée. Soleil ou mi-ombre, -15°C.

code tarif **E**

Lonicera tatarica 'Arnold red'

famille : **Caprifoliaceae**

milieu :

géo : Horticole

Buisson au tiges dressées de 1,50 à 2 m en tout sens, tiges à l'écorce grisâtre s'exfoliant. Feuilles oblongues, caduques, vert franc. Petites fleurs rose magenta au printemps, légèrement odorantes. Baies jaune orangé à l'automne. Soleil ou mi-ombre. Massif d'arbustes, haie fleurie, isolée. -15°C.

code tarif **E**

Mahonia fremontii

famille : **Berberidaceae**

syn. : *Berberis fremontii*

milieu : Chaparral

géo : Arizona, Nouveau Mexique, Utah

Petit arbuste persistant de 1 à 1,50 m de hauteur au port dressé. Rameaux raides. Feuilles glauques et épineuses. Floraison jaune en grappe à la fin du printemps, fruits rouges. Plein soleil ou mi-ombre, sol trèsbien drainé. Massifs d'arbuste, haie vive, grande rocaille, -15°C.

code tarif **H**



M Mahonia haematocarpa

famille : Berberidaceae

milieu : chaparral, zone aride

géo : Arizona, Nouveau Mexique

Arbuste persistant de 2 à 3 m de hauteur, 2m de largeur. Beau feuillage bleuté. Floraison jaune en grappe au printemps. Soleil ou mi-ombre. Haie vive, massif d'arbuste, grande rocaille, - 20°C.

code tarif **H**



Mahonia nevinii

famille : Berberidaceae

milieu : zones sèches et côtières de maquis et chaparral.

0 à 1800 m d'alt

géo : Californie

Arbuste d'1,50 à 3m, persistant. Tiges rouge-brun, raides et ramifiées, portant de jolies feuilles épineuses bleu-vert. L'arbuste est recouvert d'épis de fleurs jaunes au printemps, suivies de baies rouges à jaune rougeâtre apprécié des oiseaux. Soleil, mi-ombre, Haie, bosquet d'arbustes, isolé. -12°C

code tarif **H**



Mahonia trifoliata glauca

famille : Berberidaceae

milieu : colline, bois ouvert, pente et falaise rocheuse, bosquet ouvert.

géo : Texas, Nouveau Mexique, Arizona

Buisson dressé de 0,90 à 1,80 m de hauteur, persistant. Beau feuillage gris vert à bleuté, ressemblant à la forme du houx. Floraison jaune en grappe au printemps, parfumée. Baie rouge à la fin du printemps. Soleil ou mi-ombre. Haie vive, massif d'arbuste, grande rocaille, - 20°C.

code tarif **H**

Malacothamnus aboriginum

famille : Malvaceae

milieu : pente rocheuse ouverte dans le chaparral

géo : Californie

Arbuste persistant formant un buisson d'1 à 1,20 m en tout sens. Feuillage lobé, gris vert, légèrement duveteux. Ressemble à une lavatère. Floraison rose clair au printemps début d'été. Soleil, sol rocailleux, -15°C.

code tarif **G**

Malacothamnus fremontii

famille : Malvaceae

milieu : Chaparral, forêt de chêne, contrefort du désert de Mojave -

géo : Californie

Petit arbuste formant un buisson dressé de 1-1,80 mètres de hauteur. Les feuilles ovales sont gris vert très clair très duveteuse. L'inflorescence est une grappe allongée de nombreuses fleurs rose pâle. Soleil, sol drainant. Rocaille, massif, -12°C

code tarif **G**

Medicago arborea

famille : Fabaceae

milieu : garrigue

géo : bassin méditerranéen

Luzerne arborescente

Arbuste de 1,50 à 2 m en tout sens. Le feuillage est caduc par forte sécheresse estivale et disparaît à - 10°C, - 12°C, dans ce cas, il y aura absence de floraison. Fleur jaune orangé de janvier à fin avril. Soleil ou mi-ombre, - 12°C.

code tarif **D**

Myrtus communis

famille : Myrtaceae

milieu : maquis aride

géo : bassin méditerranéen

Arbuste de 2 m à 3 m en tout sens, feuillage persistant vert, luisant, très odorant. Fleurs blanches en fin de printemps début d'été. Croissance lente. Mi-ombre ou soleil, Demande un sol pas trop calcaire. Haie basse, massif d'arbustes, haie vive. -12°C.

code tarif **E**

Myrtus communis subsp.tarentina

famille : Myrtaceae

milieu : maquis

géo : bassin méditerranéen

Plante identique mis à part que son feuillage est beaucoup plus dense et ses feuilles plus petites.

code tarif **E**

Myrtus communis "Flores Pleno"

famille : Myrtaceae

milieu :

géo : Horticole

plante identique à la myrte commune mais les fleurs sont doubles et ressemble à des petits pompons blancs.

code tarif E

Ostrya carpinifolia



famille : Betulaceae

milieu : forêt de feuillus, bois, côtes nord

géo : Europe méridionale, Europe Centrale, Asie occidentale

Arbre à port dressé, conique, de 3 à 15m à plus, à l'écorce brun rougeâtre jeune devenant brun gris avec le temps. Feuille verte oblongue très nervurée, jaune à l'automne, caduque. Fleur en forme de chaton blanc rosé au printemps, suivie de fruit rappelant ceux du houblon. Soleil, mi-ombre. -20°C. Haie libre, charmille, bosquet d'arbuste.

code tarif E

Paliurus spina-christi

famille : Rhamnaceae

milieu : talus, friches, haies, décombres, sol alluvions argilo limoneux, graveleuses 25 à 600m d'alt

géo : Europe du sud

Porte-chapeaux, Epine du Christ

Arbuste caduc, très épineux de 3 à 4 m formé de rameaux dressés se développant en zig-zag. Fleurs vert jaunâtre au printemps, suivies de fruits très décoratifs, largement ailés, aplatis, persistant sur la plante une grande partie de l'hiver. Haie libre et défensive, en isolé, massif d'arbustes. -15°C.

code tarif D

Parkinsonia aculeata



famille : Fabaceae

milieu : prairie, rocaille, désertique - 0 à 1300m d'alt

géo : Amérique du Sud, Mexique, Californie

Arbuste épineux de 4 à 6m de hauteur. Très petite feuille vert foncé tombant le long de la branche. Ecorce, branches et rameaux lisse, vert jaune. Grappes de fleurs en forme de pois, odorantes, jaune doré au printemps. Soleil. Haie, isolé, bosquet d'arbuste. -10°C

code tarif E

Perovskia atriplicifolia 'Filigran'

famille : Lamiaceae

milieu :

géo : Horticole

Forme à feuille très découpée comme une fougère, gris vert. Floraison bleu violacé de juin à septembre. Plein soleil, sol sec et drainé, -15°C.

code tarif D

Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire'

famille :

milieu :

géo : Horticole

Arbuste caduc de 1 à 1,20 m selon la richesse du sol, feuillage gris bien découpé à odeur fortement camphrée et très collant, tiges blanches. Fleurs bleu mauve très abondantes de juin à septembre. Plein soleil, sol sec et drainé, -15°C.

code tarif D

Perovskia scrophularifolia

famille : Lamiaceae

milieu : plateaux arides, pentes rocheuses

géo : Tadjikistan, Turkménistan

Arbuste d'1 m environ, feuillage gris vert découpé, plus large que *atriplicifolia*, odorant. Fleurs bleu roy très lumineuses de juin à septembre. Plein soleil, sol sec et drainé, massif associé aux vivaces, haie basse, rocaille, -15°C.

code tarif D

Philadelphus 'Belle Etoile'

famille : Hydrangeaceae

milieu :

géo : Horticole

Seringat

Arbuste caduc de 1 m en tout sens. Fleurs blanches à centre pourpre, très parfumées, odeur de fraise des bois à la fin du printemps. Massif d'arbuste, isolé, bac. - 15°C.

code tarif F

P **Phillyrea angustifolia**

famille : **Oleaceae**

milieu : Forêt de chêne vert

géo : Bassin méditerranéen

Filaire à feuille étroite

Arbuste persistant de 2 à 3 m de hauteur, 2 m de largeur.

Feuille fine, verte, luisante et coriace. Floraison blanche, parfumée au printemps suivie de fruit noir décoratif à l'automne. Croissance lente. Plein soleil ou mi-ombre. Haie vive, haie basse, massif d'arbustes. - 20°C.

code tarif **E**

Phillyrea latifolia

famille : **Oleaceae**

milieu : Bois, garrigue

géo : Bassin méditerranéen

Filaire à large feuille

Même description que le précédent mais à feuilles larges.

code tarif **E**

Phlomis x cytherea

famille : **Lamiaceae**

milieu : garrigue, de 300 à 500m alt

géo : Grèce, Crête

hybride naturel de *P. cretica* x *P. fruticosa* - Arbuste de 40 à 60 cm en tout sens feuillage d'un très beau gris vert clair, au printemps. Fleurs jaunes au début du printemps. Plein soleil, sol sec, rocaille, massif, - 12°C.

code tarif **E**

Phlomis x 'Tepee'

famille : **Lamiaceae**

milieu :

géo : Horticole

Un des parents est *Phlomis lanata*

Arbuste de 80 cm en tout sens. Sa feuille est petite vert olive, ses tiges dressées sont acajou très décoratives. La floraison est jaune foncé en avril. Plein soleil, massif de vivaces, talus, rocaille. - 15°C. 1 à 2 /m2

code tarif **E**

Phlomis x 'Orangette'

famille : **Lamiaceae**

milieu :

géo : Horticole, Pépinière de l'Armalette

Hybride obtenu à la pépinière croisement entre *P. leucophracta* x *P. lunariifolia*.

Arbuste au port dressé d'1 à 1,50m de hauteur par 0,90 m de large. Le feuillage est épais, légèrement gaufré vert moyen au revers gris vert sur une tige brun rougeâtre. La fleur a une lèvre supérieure orange profond et une lèvre inférieure jaune clair. Soleil, sol argilo calcaire, -15°C. Haie, bosquet d'arbustes, jardin naturel, talus.

code tarif **E**

Phlomis aurea

famille : **Lamiaceae**

syn. : *P. angustifolia*, *P. flavescens*.

milieu : parmi les rochers dans le désert du Sinai, Mont Ste Catherine

géo : Egypte, Liban, Syrie.

Arbuste de 60 à 90 cm en tout sens, Les feuilles et surtout les jeunes sont recouverte de poils dorés au printemps, d'où son nom. La floraison est jaune en mai juin. Plein soleil, sol bien drainé. - 12°C. 1 /m2

code tarif **E**

Phlomis bourgaei

famille : **Lamiaceae**

milieu : maquis, forêt de pins, 0 à 1000m d'alt

géo : Turquie

Arbuste persistant de 0,80 à 1 m en tout sens. Feuilles gris vert, tomenteuses, cordiforme à la base. Floraison jaune d'or au printemps contrastant avec le feuillage. Soleil. Massif d'arbuste, talus. -15°C.

code tarif **F**

Phlomis bovei ssp.maroccana

famille : **Lamiaceae**

milieu : Massif de l'Atlas

géo : Maroc

Buisson compact de 1 m de diamètre et 50 cm de hauteur. Grandes feuilles vertes, duveteuses. Au printemps, fleur rose pâle à lèvre inférieure mouchetée de rose foncé dépassant du feuillage sur des tiges de 40 à 60 cm de hauteur. Plein soleil, -12°C. 1 à 2 /m2

code tarif **F**

Phlomis chrysophylla

famille : Lamiaceae

milieu : Pentès rocheuses, garrigue

géo : Liban, Syrie, Israël

Arbuste de 60 à 80 cm en tout sens, feuillage duveteux vert doré, persistant. Fleur jaune avec une lèvre blanche en avril mai. Soleil, sol sec, -12°C. 1 à 2/m2

code tarif E

Phlomis fruticosa

famille : Lamiaceae

milieu : Collines rocailleuses, paturages calcaires

géo : Grèce, Timfi 1500 msud de l'Europe, Asie

mineure

Sauge de Jérusalem

Imposant arbuste de 1,20 à 1,50 m en tout sens, feuillage duveteux vert au revers gris, persistant. Floraison jaune au printemps. Haie basse, massif d'arbuste, isolé. - 15°C. 1 /m2

code tarif D

Phlomis grandiflora

famille : Lamiaceae

syn. : *P.lunariifolia*

milieu : Collines calcaires et rocailleuses, garrigue, entre 600 et 1200m d'alt.

géo : GrèceTurquie, Anatolie

Phlomis à grandes feuilles ovales de 60 à 80 cm de hauteur, feuillage duveteux gris blanchâtre presque laineux, persistant. Floraison jaune au printemps. -15°C.

code tarif E

Phlomis italica

famille : Lamiaceae

syn. : *Phlomis balearica*, *Phlomis rotundifolia*

milieu : Pieds des falaises calcaires, pentes, lieux incultes, matorral à lentisques

géo : Espagne, endémiques des Baléares

Phlomis à feuilles ovales formant un buisson de 60 à 80 cm de hauteur, feuillage duveteux gris presque laineux, persistant. Floraison rose au printemps. -15°C.

code tarif E

Phlomis lunariifolia

famille : Lamiaceae

syn. : *P.imbricata*

milieu : Bois de pin d'alep maquis, collines rocailleuses, calcaires, entre 0 & 640 m d'alt.

géo : Turquie Chypre

Arbuste dressé de 1 à 2 m de hauteur, 1 m de largeur, floraison jaune vif au printemps. Feuillage persistant vert glauque, de forme allongé. Plein soleil ou mi-ombre. -12°C.

code tarif E

Phlomis lycia

famille : Lamiaceae

milieu : maquis, escarpement sinueux de 0 à 640m alt.

géo : Sud de l'Anatolie, Iles de l'Egée

Arbuste de 0,8 à 1,20 m, feuillage à la couleur étonnante, vert doré au printemps devenant vert jaune en été avec la sécheresse. Fleurs jaunes au début du printemps. Plein soleil, sol sec, massif, isolé, rocaille, - 12°C.1 /m2

code tarif E

Phlomis monocephala

famille : Lamiaceae

milieu : Forêts de chênes et de cèdres, rocailles calcaires, de 0 à 1500m d'alt

géo : Turquie

Arbuste de 1 à 1,50 m en tout sens . Feuille lineaire, tomenteuse, vert jaune. La floraison est jaune, unique en tête de tige en avril mai. Soleil mi-ombre. -15°C. 1 /m2

code tarif E

Phlomis pichleri

famille : Lamiaceae

syn. : *P.ferruginea*

milieu : Garrigue, broussailles, sur des strates rocailleuses entre 0 et 800m d'alt.

géo : Crète Carpates

Arbuste persistant au feuillage vert tomenteux et légèrement rugueux. Il atteint 1m en tout sens. Abondante floraison jaune au printemps.Soleil, sol sec,rocaille, massif, -10°C. 1m/2

code tarif F

P **Phlomis purpurea**

famille : **Lamiaceae**

milieu : Garrigue, pente rocailleuse

géo : Sud de l'Espagne, sud du Portugal, Maroc

Arbuste de 60 cm à 1,20 m de hauteur, 1 m de largeur. Feuillage duveteux gris vert plus ou moins blanc selon les souches, persistant ou rabattu par le froid à partir de -10°C ; dans ce cas la floraison est supprimée. Floraison mauve, rose violacé au printemps. Plein soleil, sol sec et drainé. Massif de plantes vivaces, d'arbustes. -10/-12°C.

code tarif **E**

Phlomis purpurea subsp.almeriensis

famille : **Lamiaceae**

milieu : garrigue, zone rocheuse et rocailleuse

géo : Sud de l'Espagne, Almeria, Grenade

Petit arbuste compact de 60 à 90 cm en tout sens. Feuilles duveteuses grises, presque blanche. Fleur rose avec une lèvre inférieure blanche au printemps. Plein soleil, sol drainé, rocaille, jardin naturel, massif. -10°C. 5 /m2

code tarif **E**

Phlomis purpurea 'Alba'

famille : **Lamiaceae**

milieu : garrigue

géo : Sud de l'Espagne,

Arbuste de 0,60 à 1m de hauteur, 0,80m de largeur. Feuillage duveteux gris vert plus ou moins blanc, persistant. Floraison blanche au printemps. Plein soleil, sol sec et drainé. -10/-12°C. Massif de plantes vivaces, d'arbustes, rocaille.

code tarif **E**

Phlomis viscosa

famille : **Lamiaceae**

milieu : Garrigue, pentes rocailleuse, entre 300 et 1440 m d'alt

géo : Liban, Turquie, Syrie, Palestine

Arbuste persistant de 0,80 à 1 m en tout sens, feuilles vert profond aux nervures bien marquées. Floraison jaune d'or au printemps contrastant avec le feuillage. Soleil. Massif d'arbuste, talus. -15°C. 1 /m2

code tarif **E**

Photinia serrulata

famille : **Rosaceae**

syn. : *P.serratifolia var.serratifolia*

milieu : Forêt mixte et bord de chemin, coteaux.

géo : Chine

Arbuste au port érigé formant une touffe de feuillage dense de 2,50 m à 3 m, persistant. Feuille verte, vernissée, jeune pousse orangé bronze. Floraison blanche de mars à mai. Soleil ou mi-ombre, haie, -15°C.

code tarif **E**

Pistacia lentiscus

famille : **Anacardiaceae**

milieu : garrigue, rocaille

géo : Bassin méditerranéen

Arbuste au feuillage persistant pouvant rougir durant l'hiver. Feuilles paripennées verte. Petites fleurs rouges au bout des branches au printemps. Elles sont suivies de drupes rouges virant au noir. Croissance lente. Soleil, haie libre, haie basse, art topiaire, jardin naturel, rocaille, -15°C.

code tarif **E**

Pistacia terebinthus

famille : **Anacardiaceae**

milieu : garrigue, pente rocheuse

géo : Bassin méditerranéen

Arbuste caduc de 2 à 3m de haut, 2 m de large environ. Les jeunes feuilles sont rouge à orangé et virent ensuite au vert, superbe coloration automnale rouge orange plus ou moins marqué selon les clones. Grappes de fleurs rouges au printemps. Soleil. Haie libre, isolé, jardin naturel, rocaille, -15°C.

code tarif **E**

Pittosporum truncatum

famille : **Pittosporaceae**

milieu : Forêt, pente rocailleuse

géo : Chine

Arbuste de 2 à 2,50 m de hauteur, feuille simple, ovale, verte vernissé au dessous vert clair, persistant. Inflorescence en ombelle de fleurs blanc crème, parfumée, au printemps. Soleil, haie, bosquet d'arbuste, -15°C.

code tarif **E**

Prunus mahaleb

famille : Rosaceae

milieu : rochers calcaires.

géo : Europe du sud, Afrique du nord, Asie Mineure

Bois de Ste Lucie- Arbuste de 1 à 4m à rameaux nom-
breux. Feuilles ovales légèrement dentées, vert clair et
Fleurs blanches au printemps suivie en été de drupes
noires à la saveur amère. Soleil, mi-ombre - Haie vive,
isolé, bosquet d'arbustes. -15°C.

code tarif D

Ptelea trifoliata

famille : Rutaceae

milieu : pentes rocheuses, lisières de bois, fourrés
alluviaux et graviers, lieux humides

géo : Amérique du nord

Orme de Samarie- Arbuste de 3 à 6m au feuilles vert bril-
lant, caduque. Floraison blanc vert à la fin du printemps
suivi de fruits (goût amère) en octobre . Soleil, mi-ombre,
haie, bosquet d'arbuste

code tarif G

Pseudocytodonia sinensis

famille : Rosaceae

syn. : *Chaenomeles sinensis*

milieu : Pentes jusqu'à 1000m d'alt

géo : Chine

Arbuste caduc aux feuilles dentées, coriaces, vert brillant
devenant rouge cuir à l'automne. Les branches sont sans
épines, et l'écorce brun foncé est décorative. Les fleurs
solitaires roses aux coeurs rose foncé s'ouvrent durant la
deuxième partie du printemps. Soleil, -20°C. Isolé, haie.

code tarif E

Pyrus spinosa

famille : Rosaceae

milieu : Lieux secs et arides, lisières forestières garri-
gues, matorrals.

géo : Bassin méditerranéen, Asie mineure, Afrique du
Nord

Poirier à feuilles d'amandier -Arbuste de 0,50 à 6m for-
mant un buisson épineux au port parfois irrégulier. Feuille
oblongue, verte au revers blanchâtre et tomenteux. Fleurs
blanches au printemps, suivie à l'automne de petits fruits
arrondis à la base. Soleil-mi-ombre. Haie vive, bosquet
d'arbustes, isolé.

code tarif D

Retama sphaerocarpa

famille : Fabaceae

syn. : *Lygos sphaerocarpa*

milieu : Matorral, fourrés dans les forêts de chêne
dégradées de chênes

géo : Espagne, Afrique du Nord

Arbuste de 2 à 3 m de haut environ, Les feuilles très pe-
tites laissent remarqué les tiges pubescentes érigées lui
donnant un aspect argenté au vent. Floraison de grappes
jaunes de mai à juin. Sol rocailleux et sec, plein soleil.
Haie vive, massif d'arbuste, isolé -15°C.

code tarif E

Rhamnus alaternus

famille : Rhamnaceae

milieu : garrigue

géo : Bassin méditerranéen

Alatene, Neprum

Arbuste persistant de 3 à 4 m de hauteur, 2 à 3 m de lar-
geur. Feuilles vertes, luisantes et coriaces. Floraison en
grappe de fleurs couleur crème au printemps. Soleil ou
mi-ombre, - 20°C.

code tarif D

Rosa 'Sir Cedric Morris'

famille : Rosaceae

milieu : Aurait été obtenue à la suite d'un semis par Sir
Cedric Morris et introduit par Beales en 1980

géo : Horticole

Rosier grimpant d'une grande vigueur, les tiges puis-
santes sont très épineuses, le feuillage composé à des
reflets bleuté. La floraison est blanche à coeur jaune, les
fleurs sont petites mais rassemblées en grappes serrées
formant une floraison très attrayante. Les fleurs sont par-
fumées. Soleil mi ombre, -15°C. Palissé dans un arbre
ou sur une pergolas

code tarif E

Rosa banksiae 'Alba Plena'

famille : Rosaceae

milieu : Pentes sèches, haies libres de la région de
Yunnan

géo : Chine

Liane produisant des tiges de 10 à 12 m de longueur,
feuillage vert brillant, lisse, semi- persistant. Rosier peu
épineux très vigoureux. Fleurs doubles blanches et parfu-
mées tôt au printemps. - 15°C.

code tarif E

R Rosa banksiae 'Lutea'

famille : Rosaceae

milieu :

géo : Chine

Rosaceae - Chine

Identique, diffère par sa floraison généreuse de pompons jaune d'or. - 15°C.

code tarif E

Rosa banksiae var.normalis

famille : Rosaceae

milieu : Pentès sèches, haies libres

géo : Chine

Même forme aux petites fleurs simples blanches très parfumées. Aiguillons rares ou absents. - 15°C.

code tarif F

Rosa banksiae 'Purezza'

famille : Rosaceae

milieu : Hybride obtenue par Quinto Mansuino.

géo : Horticole

Plus petit que les autres R.banksiae de 5 m de hauteur. Feuillage vert brillant, lisse, semi- persistant. Rosier peu épineux, très florifère, à fleurs doubles blanches et parfumées au printemps pouvant remonter. Soleil, mi-ombre, grimpant, jardin naturel. - 15°C.

code tarif E

Rosa bracteata

famille : Rosaceae

milieu : introduit en culture en Europe dans les années 1793/1795

géo : Sud-est de la Chine

Liane de 5 à 8 m de hauteur, tiges poilues aux épines acérées. Feuillage très dense, feuilles vert brillant, persistantes, épaisses. Grande rose simple blanche à étamines dorées dégageant une odeur de melon avec la rosée du matin. Plein soleil, très résistant à la sécheresse, -12°C.

code tarif F

Rosa brunonii 'La Mortola'

famille : Rosaceae

milieu : Introduit en culture en 1822

géo : Afghanistan, Népal, Ouest de la Chine

Arbuste puissant aux tiges vigoureuses pouvant atteindre 5 à 6 m. Plante épineuse. Nombreuses fleurs blanc pur aux étamines jaunes très parfumées au printemps. La plante peut être utilisée en arbuste pour haie libre ou guidé et palissé. Soleil mi ombre, -15°C. Grimpant haie libre, jardin naturel

code tarif E

Rosa chinensis 'Mutabilis'

famille : Rosaceae

syn. : *R. Tipo Ideale*

milieu : introduit en Europe vers 1895

géo : Chine

Arbuste de 1,50 à 2 m. Feuillage vert foncé, jeunes pousses pourpres, forme un buisson compact. Fleurs simple rose chamois à l'ouverture passant au rose clair et virant au rose cuivré. Floraison au printemps et remontant à l'automne. Soleil ou mi-ombre légère. Haie libre, massif, isolé en masse. -15°C.

code tarif E

Rosa chinensis 'Sanguinea'

famille : Rosaceae

syn. : *R. Bengale rouge*

milieu :

géo : Chine

Arbuste de 1,20 à 1,50 m en tout sens, feuillage persistant vert, superbe jeunes pousses rougeâtres lors de sa croissance. Fleur simple rouge pourpre, légèrement parfumée au printemps et à l'automne. Soleil ou mi-ombre légère. Haie libre, massif, masse isolé. - 15°C.

code tarif E

Rosa chinensis var.minima 'L'Ange Blanc'

famille : Rosaceae

milieu :

géo :

Rosier nain de 50 cm à 1 m en tout sens, feuillage vert, luisant semi-persistant. Floraison blanche au printemps et à l'automne, un peu en été si arrosage. Plein soleil. Haie libre, massif, masse isolée. -12°C.

code tarif E

Rosa laevigata

famille : Rosaceae

milieu : rochers en bord de cours d'eau de 0 à 1000m d'alt.

géo : Sud de la Chine, Laos, Vietnam

Grimpant très vigoureux de 7 à 10 m de hauteur. Feuillage vert foncé, feuilles luisantes et épaisses. Grande fleur simple blanc pur aux longues étamines dorées, parfumées, en mai juin, persistant. - 12°C

code tarif **F**

Rosa sempervirens 'prostrata'

famille : Rosaceae

milieu : garrigue, broussailles, taillis et forêts

géo : Sud de l'Europe, Turquie, Afrique du Nord

Arbuste vigoureux de 0,50 à 1 m de haut, 4 à 5 m de large. Feuillage brillant, semi-persistant rougissant avec le froid, aiguillons rouges contrastant avec les tiges vertes. Fleurs blanches de 2 à 3 cm de diamètre, simples, isolées, très odorantes en mai juin. Soleil à mi-ombre. Grimpante, couvre-sol. Talus, rocaille, jardin naturel, - 15°C. 1/m2

code tarif **E**

Rosa xanthina f. spontanea

famille : Rosaceae

milieu : zones sèches. Introduit en Europe vers la fin du 19°S.

géo : Chine, Corée

Tiges dressées partant du sol de 1,50 à 2 m de hauteur. Forme un buisson compact s'étalant avec le temps, caduc. Tiges et épines décoratives. Abondantes petites fleurs jaunes le long des branches en mai, très épineux mais superbe. Soleil. Haie vive, massif d'arbuste, isolé. -15°C.

code tarif **F**

Rosmarinus x mendizaballi

famille : Lamiaceae

milieu : rocaille, bord de mer, talus pierreux

géo : Espagne (sud et sud est) et Afrique du Nord

hybride naturel de :

R. tomentosa Huber-Morath & Maire x R. officinalis L.

Feuillage persistant, gris vert, duveteux, aromatique. La plante prend un port dressé mais compact de 50 à 80 cm en tout sens. Floraison au printemps remontant à l'automne, lèvre supérieure plus ou moins orangé, lèvre inférieure bleue et blanche mouchetée de bleu foncé. Soleil, sol sec et bien drainé. - 15°C. 3 /m2

code tarif **H**

Rosmarinus x lavandulaceus

famille : Lamiaceae

milieu : Matorral

géo : Espagne

hybride naturel de : R. eriocalyx x R. officinalis - Feuillage vert soutenu, odorant, persistant. Plante au port compact de 60 par 60 cm. Floraison bleu clair au printemps. Soleil, mi-ombre, rocaille, jardin naturel. -12°C.

code tarif **E**

Rosmarinus eriocalyx

famille : Lamiaceae

syn. : R. officinalis var. tournefortii

milieu : Matorral sec, dans les remblais, sol calcaire ou argileux

géo : Espagne (sud et sud est) et Afrique du Nord

Feuillage persistant vert foncé, aromatique. La plante prend un port semi prostré de 80 cm à 1m en tout sens. Floraison en fin d'hiver début du printemps, la lèvre supérieure est bleu violacé, la lèvre inférieure est bleu violacé avec une tache blanche mouchetée de bleu foncé à sa base (gorge). Bouton floral est très poilu avec un long pédoncule. Le pistil et les étamines sont très longues et recourbées vers le bas. Soleil, sol sec et bien drainé.

code tarif **E**

R Rosmarinus officinalis 'Roseus'

famille : Lamiaceae

milieu :

géo : Horticole

Arbuste compact, persistant de , 0,50 à 1m en tous sens, feuillage vert soutenu, persistant. Fleurs roses mouchetées de rose foncé. Soleil, sol sec et drainé, - 20°C. Couvre sol, massif, bordure.

code tarif **D**

Rosmarinus officinalis 'Corsican Blue'

famille : Lamiaceae

milieu :

géo : Horticole

Feuillage vert foncé persistant. Port rampant 20 à 30 cm de hauteur, très étalé 1m et plus de largeur. Floraison bleu soutenu en février mars. Soleil ou ombre. - 15°C

code tarif **D**

Rosmarinus officinalis 'Alba'

famille : Lamiaceae

milieu : garrigue

géo : bassin méditerranéen

Forme dressé de romarin. Il atteint 40 à 60 cm de hauteur par 40 cm de largeur, Feuillage vert foncé, persistant. Bouton floral jaune, floraison blanche. Soleil ou mi ombre. Jardin d'aromatique, massif d'arbustes, rocaille. -15°C. 3 à 5/m2

code tarif **D**

Rosmarinus officinalis 'Tourtour'

famille : Lamiaceae

milieu : garrigue

géo : Bassin méditerranéen

Forme dressé, de 0,80 à 1m de hauteur, par 50 cm de largeur. Floraison bleu très intense. -15°C, 2 à 3 /m2

code tarif **D**

Rosmarinus officinalis 'Tholos de la Lauve'

famille : Lamiaceae

milieu : garrigue

géo : Bassin méditerranéen

Forme naine, compacte, 30 à 40 cm en tout sens. Floraison bleu pâle, bouton floral presque noir. Idéal pour des haies basses, rocaille, en remplacement du buis. 5/m2

code tarif **D**

Rosmarinus officinalis 'Pointe du Raz'

famille : Lamiaceae

milieu :

géo : Horticole

Feuillage vert foncé persistant. Port rampant 20 à 30 cm de hauteur, très étalé 1m et plus de largeur. Floraison bleu soutenu en février mars. Soleil ou ombre. - 15°C.

code tarif **D**

Rosmarinus officinalis var.repens

famille : Lamiaceae

milieu :

géo : Bassin méditerranéen,

Feuillage vert grisâtre, persistant. Port très rampant 20 à 30 cm de hauteur, très étalé 1m et plus de largeur. Floraison bleu clair en février mars. Soleil ou ombre. - 15°C. Bord de muret, couvre sol, talus, pot.

code tarif **D**

Rosmarinus officinalis 'Pat et Val'

famille : Lamiaceae

milieu : matorral

géo : Espagne

Buisson compact, dressé de 60 cm à 1,20 m en tout sens. Feuille plus large que les espèces locales. Fleur bleu très pâle presque blanc, lèvre inférieure moucheté de bleu soutenu. Bouton floral gris violacé. abondante floraison de février à avril. Soleil, mi-ombre, -15°C. Massif d'arbustes, haie basse, jardin d'aromatique, talus. 5/m2

code tarif **D**

Searsia albida

famille : **Anacardiaceae**

milieu : dunes, rocaillies

géo : Afrique du Nord, Iles Canaries

Arbrisseau à port prostré, d'1 à 2 m de large par 0,40m de hauteur. Feuilles alternes, digités, gris vert, persistante sauf en cas d'extrême sécheresse. Floraison jaune clair en automne suivie de drupes rouge orangé au printemps suivant. Soleil, Rocaille, bord de restanque, -10°C.

code tarif **F**

Sophora davidii

famille : **Papilionaceae**

syn *Sophora viciifolia*

milieu : pente des collines en dessous de 3400m d'alt

géo : Chine

Arbuste caduc de 2 à 2,50 m de hauteur. Tiges souples, de couleur sombre, épineuses. Feuillage vert tendre. Fleurs blanc lilas rappelant une fleur de pois au printemps. Soleil mi-ombre, sol drainant. Massif d'arbustes, haie vive. -20°C.

code tarif **F**

Sorbus domestica

famille : **Rosaceae**

milieu : Haie et bois, sol calcaire

géo : Europe méditerranéenne, Afrique du Nord

Arbuste caduc de 15m à plus. Feuilles pennées, verte légèrement cotonneuses sur l'envers, jaune d'or à l'automne. Corymbe de fleurs blanches au printemps suivie de fruits (drupes) en forme de pomme ou de poire à l'automne. Le fruit se consomme blet. Soleil, mi-ombre, -15°C. Haie vive, bosquet d'arbustes.

code tarif **E**

Spartium junceum

famille : **Papilionaceae**

milieu : matorral

géo : Sud de l'Europe, Afrique du Nord

Genêt d'Espagne

Arbuste persistant de 2 à 3 m en tout sens. Les rameaux ont une forme de jonc avec très très peu de feuilles, sans épines. Floraison parfumée jaune de mai à juin. plein soleil, haie vive, jardin naturel. -15°C.

code tarif **D**

Sphaeralcea ambigua

famille : **Malvaceae**

milieu : pentes rocailleuses et sableuses des zones désertiques

géo : Californie, Arizona, Utah, Nevada

Feuillage gris vert, duveteux. Son port est dressé sur des tiges d'environ 1m de hauteur, floraison orange vif au printemps. À besoin d'un sol bien drainé pas trop argileux pour réussir. Plein soleil, sol sec. Massif d'arbuste, de vivaces. -12°C.

code tarif **F**

Styrax officinalis

famille : **Styracaceae**

milieu : Bois, matorral

géo : Bassin méditerranéen

Aliboufier

Arbuste de 5 à 7 m au port buissonnant, caduc. Feuille ovale avec une nervure centrale marquée, verte au revers blanchâtre. Floraison blanche, mellifère, à la fin du printemps suivie d'une petite drupe blanc vert. Soleil, mi-ombre. Haie libre, isolé. -15°C.

code tarif **G**

Syringa x laciniata

famille : **Oleaceae**

milieu :

géo : Moyen Orient

Hybride entre *S.afghanica* et *S.laciniata*.

Arbuste caduc de 1,50 à 2 m en tout sens. Son port est dressé, ses tiges sont foncées, marron. Beau feuillage vert très découpé. Floraison en long épis violet vif. Croissance lente. Soleil. Massif d'arbuste, haie vive. -15°C.

code tarif **E**

Tetraclinis articulata

famille : **Cupressaceae**

milieu : Garrigue, gorges escarpées, sur sol calcaires entre 0 et 1800m d'alt

géo : Afrique du Nord, Espagne

Cyprès de l'Atlas - Arbuste de 2 à 5 m de hauteur formant un buisson au port dressé, conique. Petites feuilles piquantes vert foncé. Floraison printanière suivie de fruit (cône) globuleux brun à l'automne. Plein soleil. Bosquet d'arbuste, haie, isolé. -15°C.

code tarif **F**

Teucrium fruticans

famille : **Lamiaceae**

milieu : coteaux littoraux

géo : Bassin méditerranéen,

Arbuste persistant de 1,50 à 2m en tout sens. Petites feuilles gris argenté. Nombreuses fleurs bleu clair apparaissant en fin d'hiver et au printemps. Soleil mi-ombre légère. Massif d'arbuste, haie libre. -15°C.

code tarif **D**

Ungnadia speciosa

famille : **Sapindaceae**

milieu : steppe arbustive, forêt de pin et genévrier.

géo : Amérique du nord/Californie

Arbuste caduc de 6 à 9m de hauteur. Grande feuille lancéolé au bord crénelé, alterne, verte à jaune en automne. Fleur rose mauve, odorante, apparaissant avant les feuilles au printemps. Soleil, mi-ombre, bosquet d'arbuste, haie. -12°C

code tarif **G**

Viburnum tinus

famille : **Caprifoliaceae**

milieu : sous-bois clair, chênaie vertes, de 50 à 500 m d'alt.

géo : Bassin méditerranéen

Arbuste de 2 à 3 m de hauteur par 1,50 à 2 m de large. Large feuille vert foncé, persistante. Bouquet de fleurs blanches aux boutons rose foncé en hiver suivi de baies noires. Soleil, mi-ombre, ombre. Excellente plante de haie mais croissance lente. -15°C

code tarif **D**

Vitex chinensis

famille : **Verbenaceae**

syn. : *Vitex negundo*

géo : Chine

Arbuste caduc au feuillage léger atteignant 2 m en tout sens. Élégantes feuilles très découpées comme de la dentelle, fleurs bleu pâle en juillet août. Plein soleil. -15°C.

code tarif **F**

Xanthoceras sorbifolium

famille : **Sapindaceae**

géo : Chine

Petit arbre de 3 à 5 m au feuillage caduc. Feuilles composées. Floraison en grappe d'avril à mai, blanc rosé, la base des pétales est brun orangé. Croissance lente, plein soleil, -15°C.

code tarif **G**

Zanthoxylum alatum

famille : **Rutaceae**

syn. : *Zanthoxylum armatum*.

milieu : Habitats variés en dessous de 3100m d'alt.

géo : Chine, Himalaya

Buisson de 3 à 5 m, feuillage à odeur de poivre. Floraison blanche au printemps, suivie de petits fruits rouges aromatiques. Arbuste persistant aux tiges rougeâtres très épineuses, -15°C.

code tarif **E**

Zanthoxylum simulans

famille : **Rutaceae**

milieu : Plaines et forêts en montagnes

géo : Chine

Arbuste épineux de 3 à 5 m au feuillage caduc, à l'odeur savonneuse. Petits fruits rouges à l'odeur de poivre, soleil, - 10 à -12°C.

code tarif **F**

x Chitalpa tashkentensis

famille :

milieu : hybride de Catalpa bignonioides et Chilopsis

linearis obtenu en 1964 au jardin botanique de Tashkent

géo : Horticole

Arbuste buissonnant de 5 à 10m de hauteur par 5m de large. Feuille caduque, oblongue, vert tendre. Fleur en trompette rose moucheté de jaune orangé en début d'été et en automne. Soleil - isolé, haie, bosquet d'arbustes -15°C.

code tarif **F**



Bupleurum fruticosum



Spartium junceum




Styrax officinalis



Phlomis x Orangette



Rosa chinensis Mutabilis



Cistus x pagei



Phlomis lanata



Fabiana imbricata



Ceanothus et abeille



Phlomis viscosa



Cistus x skanbergii



Phlomis x cytheraea



Euphorbia spinosa



Pseudocydonia sinensis



Cercis siliquastrum 'Alba'



Cephalaria ombrosoides, *Sideritis lasiantha*



Stachys lavandulifolia

Les informations fournies dans notre catalogue sont issues de nos observations des plantes testées dans notre pépinière.

Celles-ci sont arrosées uniquement à la plantation et l'entretien se passe sans aucun arrosage.

La culture de ces mêmes plantes dans d'autres conditions modifie leur comportement :

leur développement, la durée de la floraison, leur tenue au sec...

1/ La préparation du sol

La préparation du sol des plantes vivaces consiste en un bêchage profond, équivalent à un fer de bêche et à l'extraction des racines comme le chiendent.

Un apport de compost peut être réalisé, mais attention, cela ne convient pas toujours aux plantes xérophytes.

Celles-ci en sol trop riche ont une croissance trop rapide. Ce développement entraîne une croissance rapide suivi d'un dépérissement. Elles peuvent aussi prendre un port très étioilé et se coucher au moindre coup de vent ou de pluie un peu forte. Mieux vaudra ne rien rajouter au sol et garder les cailloux. La plupart de nos plantes apprécient les sols bien drainé et aéré.

2/ Les distances de plantation, et l'exposition

Les distances de plantation sont indiquées dans le catalogue. Celles-ci peuvent varier en fonction de l'attente du jardinier, du climat, de la qualité du sol, Plus on connaît ses plantes plus il est facile de les placer au bon endroit pour un meilleur résultat.

3/ La meilleure époque de plantation

La meilleure période de plantation est l'automne dès que les premières pluies se sont manifestées et jusqu'au printemps. À cette époque, le sol est chaud, les températures sont ni trop chaudes ni trop froides. Plantez lorsque le sol est ressuyé, ni trop humide ni trop sec, afin de ne pas détériorer la structure du sol.

4/ Comment arroser

Après la plantation, il est important d'arroser les plantes nouvellement installées. Cet arrosage a pour but de tasser la terre autour de la plante et de la mettre en contact avec les racines, en supprimant l'excès d'air. Arrosez avec beaucoup d'eau d'un coup pour qu'elle pénètre profondément dans le sol. Ainsi les racines iront chercher le plus loin possible l'humidité, et la plante sera plus résistante à la sécheresse. Pour les plantes vivaces plantées à l'automne ou durant l'hiver, aucun arrosage n'est nécessaire. Pour les plantes installées au printemps un suivi des arrosages une fois par semaine ou tous les quinze jours pendant l'été sera indispensable. Pour les arbustes, un suivi hebdomadaire des arrosages le premier été suivant la plantation est nécessaire afin de permettre à l'arbuste de s'installer. La seconde année, les arrosages pourront être plus espacés, au rythme d'un tous les quinze jours, surtout pendant les mois d'été.

5/ Soins

Pour les plantes vivaces, un désherbage annuel à la fin de l'hiver évite que les herbes indésirables prennent le dessus sur celles-ci.



Thymra capitata



rocaille naturelle



rocaille de la pépinière



Genista hispanica, *Euphorbia rigida*, *Centaurea ragusina*



Euphorbia spinosa, *Centaurea spinosa*



Rhodanthemum hosmariense, *Lithodora hispidula*



Scabiosa cretica



rocaïlle naturelle



rocaïlle en été



rocaïlle de printemps

Tarif

ARBUSTES		
code	litrage	prix TTC €
D	1,4l	8
	3l	14
	7l	28
E	1,4l	9
	3l	18
	7l	33
F	1,4l	13
	3l	25
	7l	37
G	1,4l	16
	3l	31
	7l	45
H	1,4l	20
	3l	40
	7l	55

Les tarifs du catalogue 2020 annulent les précédents.

Les prix s'entendent en euros toutes taxes comprises, TVA 10%.

**Paysagistes,
contactez-nous pour les prix professionnels.**

Les tarifs dégressifs s'appliquent pour des plantes d'une même variété et non pas pour l'ensemble de la commande comprenant plusieurs variétés différentes.

Ces tarifs dégressifs ne s'appliquent pas pour les codes tarifaires F, G et les arbustes.

Le fait de passer commande implique l'adhésion de l'acheteur aux conditions de vente et aux prix figurant sur le catalogue de l'année en cours.

VIVACES ET GRAMINEES «Prix Public TTC en Euro»				
code	litrage	De 1 à 25	De 26 à 50	De 51 à 100
D	godet	3	2,86	2,79
	1,4l	8	7,62	7,44
	3l	12	11,42	11,16
E	godet	4	3,81	3,72
	1,4l	9	8,57	8,37
	3l	15	14,25	13,5
F	godet	6		
	1,4l	10		
	3l	18		
G	godet	8		
	1,4l	14		
	3l	20		

Condition de vente

Commandes

Les commandes sont établies par ordre d'arrivée, il est nécessaire de noter correctement vos noms et adresses de livraison pour une bonne réception du colis. Nous vous conseillons de nous adresser une demande de disponible par email ou par téléphone avant l'envoi de votre commande, nous vous adressons alors un devis. Vous pouvez aussi commander en ligne sur notre site internet.

Pour les commandes supérieures à 150 € TTC nous consulter au préalable. Vous pouvez aussi réserver vos plantes, nous vous les apporterons sur notre stand lors d'une fête des plantes. Certaines plantes sont disponibles en très petite quantité. Il est possible de mettre en culture les plantes de votre choix dans les quantités désirées, pour cela nous consulter.

Expéditions

Les expéditions sont suspendues s'il existe un risque de dégradation des plantes dû au gel ou aux grèves des transports. Nous expédions en France et en Europe uniquement entre le lundi et le mercredi matin. Les commandes sont traitées d'une semaine sur l'autre. Nous n'expédions pas par la Poste les litrages de et supérieurs à 3 L.

Les envois sont effectués en Colissimo suivi par les services de la Poste. Les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur. Il est conseillé de vérifier l'état du colis à réception de celui-ci afin d'émettre des réserves s'il y a lieu sur le bon de livraison.

Remplacements de variétés

Dans le cas où vous ne nous adresseriez pas de demande de disponible et en cas de manque d'une variété ou du litrage de préférence, le remplacement par la variété la plus proche ou un litrage différent est

effectué à moins d'avis contraire de votre part qui donnera lieu à un avoir ou un remboursement de la somme équivalente. Une liste de remplacement est conseillée pour votre satisfaction.

Réception

Dès réception de votre colis déballez les plantes. Si vous ne pouvez pas les planter le jour même, installez dans un endroit abrité et lumineux. Arrosez les régulièrement tant qu'elles restent en pot avant la plantation.

Paiement

Les commandes devront être accompagnées de leur règlement en euros en totalité, y compris les frais de port et d'emballage.

Acceptant le règlement des sommes dues : par chèque libellé à l'ordre :

EARL Pépinière de l'Armalette

ou par virement interbancaire, dans ce cas nous contacter. Le paiement par CB s'effectue uniquement sur le site internet ou sur place à la pépinière.

Pour de grandes quantités et les professionnels nous consulter.

Reprise des végétaux

La garantie de reprise des plantes n'est pas assurée. La reprise des végétaux dépend de nombreux facteurs que nous ne pouvons pas contrôler : conditions de plantation, suivi d'arrosage la première année, conditions de sol et de climat. Pour tous renseignements de culture et de plantation nous sommes là pour vous conseiller.



Catananche coerulea



Euphorbia rigida



Hypericum olympicum v. citrina



Cistus dubius



Ebenus cretica



Euphorbia acanthothamnus

